

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Triamcinolonacetonide 0,1% en ketoconazol 2% crème niet FNA**

**Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van de bijsluiter**

1. Wat is Triamcinolonacetonide 0,1% en ketoconazol 2% crème niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Triamcinolonacetonide 0,1% en ketoconazol 2% crème niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?**

Dit medicijn bevat triamcinolonacetonide en ketoconazol. Ketoconazol is een antischimmelmiddel. Het doodt schimmels en gisten. Triamcinolonacetonide is een bijnierschorshormoon (corticosteroïd) Het werkt ontstekingsremmend en vermindert roodheid, jeuk en schilfering.

Triamcinolonacetonide 0,1% en ketoconazol 2% crème niet FNA wordt gebruikt bij:

- Schimmelinfecties van de huid die gepaard gaan met eczeem en jeuk.

Uw klachten worden meestal minder binnen een aantal dagen.

Worden uw klachten na een aantal dagen niet minder of zelf erger? Neem dan contact op met uw arts?

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

## **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?**

### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U mag de crème niet gebruiken op acne-plekken.
- U mag de crème niet gebruiken op huidaandoeningen die zijn veroorzaakt door infecties van virussen (zoals waterpokken, koortsuitslag en gordelroos). Door dit middel merkt u minder goed op als een dergelijke infectie erger wordt.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

- Bij gebruik rond het oog: laat de crème niet in het oog of op de oogleden komen.
- U heeft verhoogde oogbldruk (glaucoom). Bij gebruik in het gezicht (vooral rond de ogen en oogleden) kan de oogbldruk stijgen. Overleg met de oogarts.
- Zorg dat het middel niet in de ogen, de neus, de mond of in een wondje komt, want dat geeft irritatie. Komt het middel hier per ongeluk in terecht, spoel dan direct met veel water.
- Als u de crème of zalf gebruikt op huidplooien, op grote oppervlakken of onder een afsluitend verband. Triamcinolonacetonide dringt dan beter door in de huid. Hierdoor kan de werkzaamheid en ook de bijwerkingen van de stoffen toenemen.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Triamcinolonacetonide 0,1% en ketoconazol 2% crème niet FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de ingesmeerde plekken. U heeft dan kans dat u dit middel met het volgende weg smeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette middel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere middel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.

Gebruik op dezelfde te behandelen plekken alleen andere medicijnen na overleg met uw arts of apotheker.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Waarop moet u letten met alcohol?**

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

### *Zwangerschap*

Gebruikt u deze crème gedurende enkele dagen op een oppervlak niet groter dan de rug van uw hand? Dan kunt u het veilig gebruiken tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen hebben dit middel al jarenlang op kleine oppervlakken gebruikt zonder nadelige gevolgen voor het kind.

### *Borstvoeding*

U kunt dit middel in beperkte mate gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg met uw arts of apotheker. Smeer het middel niet op de tepels anders krijgt de baby het geneesmiddel binnen.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

### **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Dosering**

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

De standaarddosering is:

- Volwassenen en kinderen: 1 tot 2 keer per dag dun op de plekken aanbrengen.

### **Wijze van gebruik**

Smeer de crème in een dunne laag uit, ongeveer een cm breder dan de aangedane plek. Dek eventueel af met een droog verband. Was na het aanbrengen van de crème uw handen.

Schimmelinfecties van de huid die u met een antischimmelmiddel behandelt, zijn meestal na 2 tot 6 weken over. Deze crème zult u over het algemeen niet langer dan 2 weken achtereen gebruiken. Dan is de jeuk meestal over, waardoor de triamcinolonacetonide in deze crème niet meer nodig is. Omdat de schimmelinfectie dan meestal nog niet genezen is, kunt u na die tijd beter een crème gebruiken met alleen een antischimmelmiddel, zoals ketoconazol. Nadat de verschijnselen van de aandoening over zijn, nog minstens een week doorgaan met de behandeling.

### **Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Heeft u per ongeluk meer of vaker gebruikt dan de bedoeling was? Voor een keer is dit is niet ernstig. Vaak te veel gebruiken kan vervelende bijwerkingen veroorzaken.

### **Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

Bent u vergeten het medicijn te gebruiken? Smeer de crème dan alsnog. Gebruik een eventuele volgende dosis minstens 12 uur later. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn**

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven. De klachten waarvoor u de crème krijgt, kunnen dan weer terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

**Vaak** (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Branderig gevoel van de huid.
- Op de toedieningsplaats: roodheid of jeuk.

**Zelden** (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- Voorbijgaande huidirritatie
- Allergische reacties: te merken aan een verergering van de huidaandoening
- Verergering van acne, bij aanbrengen op acne-plekken
- Blaren op de huid, kleverige huid, bloedinkjes in de huid, tintelend of doof gevoel. Raadpleeg dan uw arts.

Wanneer u dit middel langer dan enkele weken gebruikt:

- Dunner worden van de huid, waardoor eerder beschadigingen ontstaan, onderhuidse bloedinkjes of blauwe plekken.
- Streepvormige littekens (striae).
- Ontkleuring of juist donkere verkleuring van de huid.
- Rode, jeukende uitslag rond de mond, neus of ogen.
- Meer haargroei op de aangebrachte plekken.
- Staar (cataract).

### **Melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

### **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.

Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

De werkzame stoffen in dit medicijn zijn triamcinolonacetonide en ketoconazol, overeenkomend met 1 mg triamcinolonacetonide (0,1%) en 20 mg ketoconazol (2%) per gram crème.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn propyleenglycol, stearylalcohol, cetylalcohol, sorbitanmonostearaat, polysorbaat, isopropylmyristaat, natriumsulfiet en gezuiverd water.

### **Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Dit medicijn is wit van kleur. De crème is per 30 gram verpakt in een tube.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### **Fabrikant:**

Savemaak C.V.  
Vilstersestraat 33  
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op [www.BijsluiterPlus.nl](http://www.BijsluiterPlus.nl) .

**Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.**