

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

HCA 1% en ketoconazol 2% crème niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is HCA 1% en ketoconazol 2% crème niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is HCA 1% en ketoconazol 2% crème niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat ketoconazol en hydrocortisonacetaat. Ketoconazol doodt schimmels en gisten. Hydrocortison werkt hetzelfde als een hormoon geproduceerd door de bijnierschors (corticosteroid). Het vermindert overgevoeligheidsreacties, ontstekingen, roodheid, jeuk en schilfering.

HCA 1% en ketoconazol 2% crème niet FNA wordt gebruikt bij:

- Schimmelinfecties van de huid die gepaard gaan met eczeem en jeuk.

Worden uw klachten niet minder na enkele dagen, of worden ze zelf erger? Neem dan contact op met uw arts.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiting.
- U heeft acne op de plekken waar u deze crème moet gebruiken.
- Uw huidaandoening is veroorzaakt door infecties van virussen zoals waterpokken, koortsuitslag en gordelroos.
- Uw huidaandoening is ontstaan door het gebruik van corticosteroiden.
- U heeft ichthyosis (visschubbenziekte).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Bij smeren rondom de ogen: laat de crème niet in de ogen of op de oogleden komen.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast HCA 1% en ketoconazol 2% crème niet FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de ingesmeerde plekken. U heeft dan kans dat u dit middel met het volgende weg smeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette middel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere middel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.

Gebruik op dezelfde te behandelen plekken alleen andere medicijnen na overleg met uw arts of apotheker.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Gebruikt u deze crème gedurende enkele dagen op een oppervlak niet groter dan de rug van uw hand? Dan kunt u het veilig gebruiken tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen hebben dit middel al jarenlang op kleine oppervlakken gebruikt zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Borstvoeding

U kunt dit middel in beperkte mate gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg met uw arts of apotheker. Smeer het middel niet op de tepels anders krijgt de baby het medicijn binnen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

De standaarddosering is:

- Volwassenen en kinderen: 1 tot 2 keer per dag aanbrengen.

Wijze van gebruik

Smeer de crème op de huid uit, ongeveer een cm breder dan de aangedane plek. Dek eventueel af met een droog verband. Was uw handen na het aanbrengen van de crème.

Schimmelinfecties van de huid die u met een antischimmelmiddel behandelt, zijn meestal na 2 tot 6 weken over. Deze crème zult u over het algemeen niet langer dan 2 weken gebruiken. Dan is de jeuk meestal over, waardoor de hydrocortison in deze crème niet meer nodig is. Omdat de schimmelinfectie dan meestal nog niet genezen is, kunt u na die tijd beter een crème gebruiken met alleen een antischimmelmiddel, zoals ketoconazol. Nadat de verschijnselen van de aandoening over zijn, moet u nog minstens een week doorsmeren.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Heeft u per ongeluk meer of vaker gebruikt dan de bedoeling was? Voor een keer is dit is niet ernstig. Vaak te veel gebruiken kan vervelende bijwerkingen veroorzaken.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Als u vergeten bent om de crème te smeren, breng de crème dan alsnog aan. Breng geen dubbele hoeveelheid crème aan om een vergeten smeerbeurt in te halen.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U dient de kuur volledig af te maken omdat anders de infectie kan terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- Overgevoeligheid voor de stoffen in de crème. Dit merkt u doordat de huidandoening niet beter wordt of juist erger wordt. Neem dan contact op met uw arts.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

- Blaren op de huid, klevrige huid, bloedinkjes in de huid, tintelend of doof gevoel. Neem contact op met uw arts.

Wanneer u dit middel langer dan enkele weken gebruikt kunnen andere bijwerkingen ontstaan, maar dit is zeer zelden het geval. De bijwerkingen ontstaan op of rond de plaats waar het middel is aangebracht:

- Dunner worden van de huid, waardoor eerder beschadigingen ontstaan
- Onderhuidse bloedinkjes, blauwe plekken
- Streepvormige littekens
- Ontkleuring of juist donkere verkleuring van de huid
- Overmatige haargroei
- Bij gebruik in het gezicht: huiduitslag rond de mond
- Bij gebruik in de buurt van de ogen: verhoging van de oogboldruk

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.

Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stoffen in dit medicijn zijn ketoconazol en hydrocortisonacetaat, overeenkomend met 20 mg ketoconazol (2%) en 10 mg hydrocortisonacetaat (1%) per gram crème.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn propyleenglycol, stearylalcohol, cetylalcohol, sorbitanmonostearaat, polysorbaat, isopropylmyristaat, natriumsulfiet, gezuiverd water.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is wit van kleur. De crème is per 30 gram verpakt in een tube.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.