

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Aripiprazol capsule 1-2,5 mg niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Aripiprazol capsule 1-2,5 mg niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Aripiprazol capsule 1-2,5 mg niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat aripiprazol. Aripiprazol behoort tot een groep medicijnen die antipsychotica worden genoemd. Het werkt door het verminderen van het effect van natuurlijk voorkomende stoffen in de hersenen, zoals dopamine. Hierdoor neemt de kans op psychoses af.

Aripiprazol wordt gebruikt bij:

- Psychose;
- Schizofrenie;
- Manie;
- Depressie;
- Onrust.

De werking begint binnen enkele uren en houdt ongeveer 24 uur lang aan.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U heeft de hartritmestoornis lang-QT-interval-syndroom. De klachten kunnen toenemen. Bijvoorbeeld hartkloppingen, duizeligheid en flauwvallen.
- U heeft de ziekte van Parkinson.
- U heeft levercirrose (erg verminderde leverfunctie).
- U heeft een extrapiramidale stoornis.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- U heeft een veneuze trombo-embolie.
- U heeft suikerziekte (diabetes mellitus).
- U heeft dementie.
- U heeft een verhoogd risico op suïcide (zelfmoord).
- U heeft epilepsie. Dit medicijn kan een aanval uitlokken.
- U heeft een verhoogd cholesterol.
- U heeft de ziekte van Sjögren. Dit medicijn kan klachten verergeren, zoals droge mond en droge ogen.
- U heeft dystonie. Dit is een aandoening in de aansturing van spieren, waardoor onwillekeurige bewegingen of een abnormale lichaamshouding ontstaat. Dit medicijn kan deze klachten verergeren.
- Als bepaalde leverenzymen bij u onvoldoende werken (CYP2D6). Het medicijn kan dan te sterk werken.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast aripiprazol nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Aripiprazol heeft invloed op andere medicijnen. Dit noemen we een wisselwerking. Hierdoor werken medicijn beter, slechter of anders. De belangrijkste wisselwerkingen van dit medicijn zijn met:

- Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt.
- Bupropion (een medicijn gebruikt bij stoppen met roken), fluoxetine en paroxetine (medicijnen tegen depressie) en kinidine (een medicijn tegen hartritmestoornissen). De hoeveelheid aripiprazol in het bloed stijgt. Mogelijk krijgt u meer last van de bijwerkingen van aripiprazol. Overleg hierover met uw arts.
- De antischimmelmiddelen itraconazol en ketoconazol. De hoeveelheid aripiprazol in het bloed stijgt. U heeft hierdoor meer kans op bijwerkingen. Overleg hierover met uw arts. Uw arts kan een ander medicijn voorschrijven of u extra controleren.
- Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

- Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

De volgende medicijnen zorgen ervoor dat aripiprazol minder goed werkt. Overleg hierover met uw arts. Als u stopt met het medicijn duurt het een paar weken totdat dit effect op aripiprazol weg is.

- De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon.
- De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
- Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressie.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol maakt het effect van dit medicijn sterker. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit medicijn, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf en slaperig worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

U kunt dit medicijn veilig gebruiken tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap (1e en 2e trimester).

Bij gebruik tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap (3e trimester) kunnen problemen ontstaan. Het kind kan dan na de geboorte last hebben van problemen met bewegen en ontweningsverschijnselen. Dit is bijvoorbeeld te merken aan slecht drinken en veel huilen. Maar het niet behandelen van uw ziekte kan ook schadelijk zijn voor u en voor de baby. Een psychose tijdens een zwangerschap geeft meer risico's voor u en voor de baby dan het gebruik van dit medicijn. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

Borstvoeding

Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts. Het medicijn komt in de moedermelk en kan schadelijk zijn voor de baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals wazig zien en slaperig, suf en duizelig zijn.

U mag de eerste 2 weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u 2 weken dezelfde dosering heeft gebruikt, mag u weer autorijden. De meeste mensen zijn dan voldoende gewend geraakt aan de effecten. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

Let op! Psychoses, schizofrenie, manie of ernstige depressie kunnen een reden zijn om geen auto te rijden. Vraag dit aan uw arts.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wijze van gebruik

Neem de capsules in met een half glas water.

Neem de capsule in tijdens het eten of vlak na het eten. U heeft dan minder kans op misselijkheid of maagklachten.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Als u vergeten bent om dit medicijn te nemen, dan kunt u de dosis alsnog zo snel mogelijk innemen. Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt moet er tussen de dosissen minimaal 8 uur zitten. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Wanneer u twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

Stop niet plotseling met het gebruik van dit middel, maar bouw het gebruik langzaam af over een periode van een aantal weken. Door plotseling stoppen kunnen er ontwenningsverschijnselen ontstaan en kunnen de klachten erger terugkeren.

Ontwenningsverschijnselen merkt u aan zweten, misselijkheid, gebrek aan eetlust, diarree, angst, slapeloosheid, onrust, loopneus, spierpijn of vreemde gevoelswaarnemingen, zoals kriebels.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Afvlakking van het gevoelsleven, verlies van initiatief en activiteit, gevoel opgesloten te zitten en een gevoel van leegte.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Moeite met bewegen, zoals stijve spieren, beven, moeite met lopen of spreken. Neem contact op met een arts als u dit merkt.
- Plotselinge spiertrekkingen, meestal van het hoofd of in het gezicht. Hierdoor kan het hoofd scheef gaan staan of kunnen er slikproblemen of spraakstoornissen optreden. Deze bijwerking komt vooral voor in de eerste dagen van het gebruik. Het verdwijnt daarna meestal weer vanzelf.
- Sufheid, slaperigheid, duizeligheid, vermoeidheid en een verminderd reactievermogen.
- Slapeloosheid, rusteloosheid, zoals niet stil kunnen zitten, liggen of staan.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- Maag-darmklachten zoals misselijkheid, buikpijn, verstopping.
- Droge mond en droge ogen.
- Gewichtstoename
- Hoofdpijn

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

- Hartkloppingen
- Haaruitval
- Leveraandoeningen. Dit merkt u aan een gevoelige opgezwollen buik of een gele verkleuring van huid en slijmvliezen, bijvoorbeeld van de ogen. Waarschuw dan een arts.
- Maligne neuroleptica syndroom. Als deze bijwerking voorkomt is dat vooral in het begin van de behandeling of bij verhoging van de dosis. Het is een ernstige bijwerking. Waarschuw direct een arts bij de volgende klachten: onverklaarbare koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en zweten.
- Bloedafwijkingen: onverklaarbare koorts, keelpijn of blaasjes in de mond en keel, plotselinge blauwe plekken of neusbloedingen kunnen hierop wijzen. Waarschuw dan een arts.
- Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten, zwellingen in het gezicht, benauwdheid. Waarschuw direct een arts.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via

het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Sluit de pot na gebruik goed af. Dit voorkomt dat de capsules vochtig worden.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is aripiprazol, overeenkomend met 1-2,5 mg werkzame stof per capsule.

De andere stof (hulpstof) in dit medicijn is primojel capsulevulmengsel FNA.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is lichtroze tot wit van kleur. De capsules zijn per 30 stuks verpakt in een pot.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilsterestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.