

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Salicylzuurzalf 10-40% FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Salicylzuurzalf 10-40% FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Salicylzuurzalf 10-40% FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat salicylzuur. Salicylzuur behoort tot een groep medicijnen die keratolytica worden genoemd. Salicylzuur maakt de bovenste laag (hoornlaag) van de huid en de nagel zacht. Het weekt dit laagje van de huid en nagel los. Het werkt ook ontsmettend.

Salicylzuurzalf 10% FNA wordt gebruikt bij:

- Verschillende huidaandoeningen zoals een droge huid, schilfering en psoriasis. Door salicylzuur blijft de huid soepel en voorkomt het verdere uitdroging. Het effect merkt u binnen een paar dagen.

Salicylzuur 20-40% FNA wordt gebruikt bij:

- Wratten;
- Likdoorns en eeltknobbels;
- Schimmelnagel (kalknagel).

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiters.
- Bij kinderen jonger dan 4 jaar.
- U mag deze zalf niet gedurende lange perioden, in hoge concentraties, op grote gedeelten van het lichaam, of op ontstoken of beschadigde huid toepassen in verband met risico op intoxicatie (salicylaatintoxicatie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- U heeft open wonden of zweeten op de plekken waar u dit medicijn moet aanbrengen.
- Pas op met contact met ogen, slijmvliezen, gezicht en genitaliën. Probeer contact te vermijden.
- Bij gebruik op armen en benen bij een verminderde doorbloeding.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Salicylzuurzalf 10-40% FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de aangedane plekken. U heeft dan kans dat u dit medicijn met het volgende weg smeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette huidmiddel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere huidmiddel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.

Gebruik op de behandelde plekken alleen andere huidmiddelen na overleg met uw arts of apotheker.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

- Bij droge huid, schilfering of psoriasis:
In kleine hoeveelheden kunt u dit medicijn veilig gebruiken tijdens de zwangerschap gedurende maximaal twee weken. Bijvoorbeeld op één of twee plekken ter grootte van een handpalm. Het heeft dan geen nadelige gevolgen voor het kind.

Wilt u dit medicijn langer gaan gebruiken of op meerdere plekken die groter zijn dan een handpalm waarop u het wilt aanbrengen? Overleg dan eerst met uw arts of apotheker.

- Bij wratten, likdoorns, eeltknobbels of schimmelnagels:
In kleine hoeveelheden kunt u dit medicijn veilig gebruiken tijdens de zwangerschap gedurende maximaal twee weken. Bijvoorbeeld op één of twee wratten, likdoorns of op een eeltknobbel. Het heeft dan geen nadelige gevolgen voor het kind.
Wilt u dit medicijn langer gaan gebruiken of heeft u meerdere plekken waarop u het wilt aanbrengen? Overleg dan eerst met uw arts of apotheker.

Borstvoeding

U kunt veilig borstvoeding geven, als u dit medicijn in kleine hoeveelheid gebruikt. Dus op een onbeschadigde huid of op een klein huidoppervlak. Er komt dan een te verwaarlozen hoeveelheid in de moedermelk terecht. Dit medicijn wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Breng dit medicijn niet aan op de borst of rond de tepel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Gebruik de zalf bij een wrat, likdoorn, eeltknobbel of schimmelnagel eenmaal per dag, bijvoorbeeld 's avonds. Als de plek door de behandeling erg pijnlijk wordt, kunt u één of twee dagen overslaan.

Wijze van gebruik

Gebruik dit middel niet in het gezicht of bij wondjes. Laat het middel niet in het oog of op de oogleden komen. Dit kan beschadigen geven. Komt het per ongeluk in het oog, de neus, mond of een wondje, spoel dan goed met water om het middel te verwijderen.

Zalf met een sterkte van 5% en 10% bij droge huid, schilfering of psoriasis

- De zalf in een dunne laag uitsmeren.
- Eventueel afdekken met een droog verband.
- Soms adviseert de arts om hierbij gedurende enkele dagen de huid af te dekken met folie of tape. Hierdoor kan de salicylzuur beter inwerken op de hoornlaag van de huid.

Psoriasis en andere schilferende huidaandoeningen: gebruik het huidproduct met salicylzuur niet als u dezelfde dag een UVB-behandeling krijgt.

Zalf met een sterkte van 20% en 40% bij wratten, likdoorns of eeltknobbels

- Week de wrat, likdoorn of eeltknobbel zo mogelijk vijf minuten in warm water en droog daarna goed af.
- Dek de omliggende huid eventueel af met een beetje vaseline of een likdoornring, om de gezonde huid tegen irritatie te beschermen.
- Smeer de wrat, likdoorn of eeltknobbel dun in met de zalf. Zorg dat de zalf niet op de huid er omheen komt.
- Plak vervolgens de wrat, likdoorn of eeltknobbel eventueel af met een stukje pleister of tape.
- Na een week gebruik de huid in goed warm water baden. Meestal kunt u er dan een laagje vanaf wrijven of vijlen, zodat de wrat, likdoorn of eeltknobbel kleiner wordt. Peuter echter niet aan een wrat, want dan kunt u zichzelf of anderen met het wratvirus besmetten.

Zalf met een sterkte van 20% en 40% bij schimmelnagel

- Dek de omliggende huid eventueel af met een beetje vaseline om de gezonde huid tegen irritatie te beschermen.
- Smeer de schimmelnagel dun in met de zalf. Zorg dat de zalf niet op de huid er omheen komt.
- Plak vervolgens de schimmelnagel eventueel af met een stukje pleister of
- Na een week gebruik de nagel in goed warm water baden.
- Schaaf of vijl de verweekte nageldeeltjes eraf.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Een keer vergeten is niet zo erg. Probeer zo veel mogelijk uw normale schema te volgen, dan heeft u sneller resultaat. Breng geen dubbele hoeveelheid zalf aan om een vergeten smeerbeurt in te halen.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Bij wratten, likdoorns en schimmelnagels: jeuk, prikkeling of branderigheid enkele minuten na aanbrengen. Meestal gaat dit binnen enkele uren over. Neem contact op met uw arts als dit niet voorbij gaat.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Bij wratten, likdoorns en schimmelnagels:
 - De gezonde huid kan beschadigen als het medicijn erop komt. Bescherm daarom de gezonde huid, door rond de wrat of likdoorn een beetje vette zalf te smeren of een likdoornring aan te brengen. Heeft u makkelijk last van wondjes die snel ontsteken of slecht genezen, zoals bij diabetes of bij een slechte doorbloeding. Neem dan altijd voor gebruik van salicylzuur contact op met een arts.
 - Droge huid of een trekkerig gevoel op de aangedane plek. Vooral wratten kunnen verharderen, waardoor ze pijn doen bij aanraken of stoten. Neem contact op met uw arts als u hier veel last van heeft.
- Bij droge huid, schilfering of psoriasis:
 - Jeuk, prikkeling of branderigheid enkele minuten na aanbrengen. Vooral als u het medicijn aanbrengt op het gezicht, in huidplooiën of op een beschadigde en ontstoken huid. Dit verdwijnt meestal binnen enkele uren. Neem contact op met uw arts als dit niet voorbij gaat of als u hier te veel last van heeft.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Neem dan contact op met uw arts.
- Bij gebruik op grote huidoppervlakken: opname van te veel salicylzuur door de huid heen in het bloed. Dit kan bijwerkingen geven, zoals hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid, misselijkheid, oorsuizen, doofheid, zweten of een snellere ademhaling. De kans op deze bijwerking is heel klein, maar neemt toe bij hogere sterktes en als u de huid na het aanbrengen van het medicijn afdekt met plasticfolie. Vooral kleine kinderen zijn gevoelig voor de effecten van salicylzuur in het bloed. Gebruik dit medicijn daarom alleen in overleg met uw arts bij kinderen onder de 4 jaar.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen (6 maanden).

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terecht komen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is salicylzuur. Dit is aanwezig in de vorm van, overeenkomend met 100 mg (10%), 200 mg (20%) of 400 mg (40%) werkzame stof per gram zalf.

De andere stof (hulpstof) in dit medicijn is witte vaseline.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is wit van kleur. De zalf is per 30 gram verpakt in een tube.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.