

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Triamcinolonacetonide 0,1% salicylzuur 10% in lanettezalf niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Triamcinolonacetonide 0,1% salicylzuur 10% in lanettezalf niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Triamcinolonacetonide 0,1% salicylzuur 10% in lanettezalf niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat triamcinolonacetonide en salicylzuur. Triamcinolonacetonide werkt hetzelfde als een hormoon gemaakt door uw eigen bijnierschors (corticosteroid). Het is een bijnierschorshormoon van gemiddelde sterkte. Het remt ontstekingen en vermindert roodheid, jeuk en schilfering. Salicylzuur zorgt dat triamcinolonacetonide beter in de huid komt. Ook maakt salicylzuur het bovenste laagje van de huid week. Hierdoor laten schilfers makkelijker los. Verder werkt het licht ontsmettend.

Triamcinolonacetonide 0,1% salicylzuur 10% in lanettezalf niet FNA wordt gebruikt bij:

- Jeukende, schilferende of ontstoken huidaandoeningen zoals ernstig eczeem en psoriasis (een huidziekte met schilferende rode plekken).

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Op plekken met een dunne huid, zoals in uw gezicht, in lichaamsplooiën of op de geslachtsdelen. De huid is daar te gevoelig voor de bijwerkingen van dit middel.
- Op acne-plekken. De acne kan verergeren.
- Bij huidandoeningen die zijn veroorzaakt door infecties met virussen (zoals waterpokken, koortstuitslag en gordelroos). Door dit middel merkt u een verergering van zulke infecties minder snel op.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Bij kinderen. Deze zalf mag u bij kinderen alleen op kleine plekken gebruiken. Kinderen met een virusinfectie zijn gevoeliger voor ernstige bijwerkingen door salicylzuur. Neem contact op met uw arts als uw kind tijdens de behandeling een virusinfectie krijgt, zoals de griep of waterpokken.
- Als u deze zalf wilt aanbrengen op huid die met een bacterie of schimmel is geïnfecteerd, zoals bij zweren of huidandoeningen met pus, bij ringworm of bij voetschimmel. Door dit middel merkt u een verergering van een dergelijke infectie minder snel op. Als u ook een medicijn tegen deze infectie gebruikt, kunt u het wel toepassen.
- Als u glaucoom heeft (verhoogde oogbaldruk). Als er per ongeluk wat van de zalf in uw oog komt kan het bijnierschorsormoon uw oogbaldruk verhogen. Was daarom na aanbrengen altijd uw handen, zodat het niet per ongeluk van uw vingers in uw oog komt.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Triamcinolonacetonide 0,1% salicylzuur 10% in lanettezalf niet FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de aangedane plekken. U heeft dan kans dat u dit medicijn met het volgende wegsmeert. Smeer eerst het corticosteroïd op de huid. Wacht dan ten minste 1 uur voordat u de vette crème of zalf smeert, die uw arts meestal ook heeft voorgeschreven.

Gebruik op de te behandelen plekken alleen andere huidmiddelen na overleg met uw arts of apotheker.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Met bepaalde voorzorgen kunt u deze zalf veilig gebruiken tijdens de zwangerschap. Het is niet veilig voor het kind:

- Als u na het smeren de huid afdekt met plastic folie of een vochtig verband;
- Als u het op grote huidoppervlakken gebruikt;
- Als u het langer dan enkele dagen gebruikt.

In deze gevallen kan er namelijk te veel salicylzuur en triamcinolonacetonide in uw bloed komen. Dat kan schadelijk zijn voor het kind. De baby kan dan bijvoorbeeld minder goed groeien.

Borstvoeding

Als u borstvoeding geeft kunt u deze zalf op een klein oppervlak gebruiken. Bijvoorbeeld zo groot als de rug van uw hand. Smeer het niet op of rond uw tepels als u vlak daarna gaat voeden. Overleg met uw arts of apotheker als u borstvoeding wilt geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

De standaarddosering is:

- Volwassenen en kinderen:
De eerste dagen 2 keer per dag aanbrengen. Daarna 1 keer per dag. Na verbetering is het meestal voldoende steeds enkele dagen te smeren en daarna een pauze van enkele dagen in te lassen. Door de pauzes blijft het middel beter werken en heeft u minder kans op bijwerkingen. Smeer tijdens de pauzes wel een neutrale crème of zalf.

Wijze van gebruik

Breng de zalf aan op de plekken. Dek eventueel af met een droog verband. Soms adviseert de arts u om de huid waarop de zalf is aangebracht af te dekken met plastic folie of een vochtig verband. Was na het aanbrengen van de zalf uw handen.

Zorg dat de zalf niet in uw ogen komt, of in uw neus, mond, of in open wonden. Het kan daar irritatie geven. Spoel in dat geval met veel water.

Op kleine oppervlakken, zoals de ellebogen: niet langer dan enkele weken achter elkaar gebruiken.

Op grotere huidoppervlakken: niet langer dan 2 weken achter elkaar gebruiken.

Moet u de zalf langer dan enkele weken gebruiken? Overleg dan met uw arts.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Heeft u per ongeluk meer of vaker gebruikt dan de bedoeling was? Voor een keer is dit is niet ernstig. Consequent te veel gebruiken kan vervelende bijwerkingen veroorzaken.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Bent u een keer vergeten dit middel aan te brengen? Dat is niet erg, smeer het dan alsnog.

Wacht daarna een paar uur voor u het weer aanbrengt. Breng geen dubbele hoeveelheid zalf aan om een vergeten smeerbeurt in te halen.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt niet zomaar stoppen met dit medicijn. Uw huidklachten kunnen dan terugkeren. Overleg hierover met uw arts. Uw huisarts kan u een afbouwschema geven. Blijf tijdens het afbouwen met dit medicijn uw huid goed verzorgen met een vette zalf of crème. Ga hier ook mee door als u helemaal met dit medicijn bent gestopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Prikkeling of een branderig gevoel. Dit verdwijnt meestal binnen enkele minuten.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Overgevoeligheid van de huid. Dit merkt u aan toenemende roodheid of uitslag, of verergering van de huidaandoening. Neem dan contact op met uw arts.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Huidinfecties vallen minder op. Dit komt omdat de zalf wel de verschijnselen van een infectie tegengaat, maar niet de infectie zelf.
- Bij mensen met psoriasis: met geel vocht gevulde blaasjes.

Gebruikt u dit middel langer dan enkele weken? Dan kunnen de volgende bijwerkingen ontstaan op of rond de plaats waar u de zalf aanbrengt. De kans op deze bijwerkingen is groter bij gebruik op een dunne huid, zoals het gezicht, de geslachtsdelen en in huidplooien. Gebruik het daarom niet op deze huiddelen. Neem contact op met uw arts bij deze bijwerkingen:

- Dunnere huid. Hierdoor ontstaan eerder beschadigingen, onderhuidse bloedinkjes en blauwe plekken.
- Streepvormige littekens, ontkleuring of juist donkere verkleuring van de huid.
- Bij gebruik in het gezicht: huiduitslag rond de mond.
- Meer lichaamshaar.
- Bij gebruik in de buurt van de ogen: verhoging van de oogboldruk en staar.

Gebruikt u de zalf op grote huidoppervlakken of langdurig op kleine oppervlakken? U heeft dan kans dat er te veel van dit medicijn in het bloed komt. Dit kan bijwerkingen geven, zoals misselijkheid of, bij kinderen, groeiremming. Vooral kinderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Bij kinderen is het daarom soms nodig dat de arts regelmatig de lichaamslengte controleert. Na stoppen haalt het kind de groei meestal weer goed in.

Gebruik deze zalf daarom op grote huidoppervlakken niet langer dan 2 weken achter elkaar. U heeft meer kans op bijwerkingen als u de behandelde plek afdekt met bijvoorbeeld plastic folie of een vochtig verband.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen (3 maanden).

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stoffen in dit medicijn zijn triamcinolonacetonide en salicylzuur, overeenkomend met 1 mg triamcinolonacetonide (0,1%) en 100 mg salicylzuur (10%) per gram zalf.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn cetiol V, propyleenglycol, cetostearylalcohol, isopropylmyristaat, vloeibare paraffine en witte vaseline.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is wit van kleur. De zalf is per 100 gram verpakt in een tube.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.