

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Tranexaminezuur 50 mg/ml mondspoeling FNA**

**Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van de bijsluiter**

1. Wat is Tranexaminezuur 50 mg/ml mondspoeling FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Tranexaminezuur 50 mg/ml mondspoeling FNA en waarvoor wordt het gebruikt?**

Dit medicijn bevat tranexaminezuur. Het voorkomt dat bloedstolsels oplossen. Hierdoor voorkomt en stopt het bloedingen.

Tranexaminezuur 50 mg/ml mondspoeling FNA wordt gebruikt bij:

- Bloedingen of gevaar voor bloedingen. Bijvoorbeeld na een tandheelkundige ingreep bij mensen die antistollingsmiddelen krijgen. Door de ingreep kan een wond ontstaan. Door de antistollingsmiddelen kan de wond opnieuw gaan bloeden. Tranexaminezuur houdt een bloedstolsel in stand, waardoor de wond niet opnieuw kan gaan bloeden.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

## **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?**

### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U heeft trombose.

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Tranexaminezuur 50 mg/ml mondspoeling FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Waarop moet u letten met alcohol?**

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

#### *Zwangerschap*

Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Laat daarom uw arts weten dat u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden.

#### *Borstvoeding*

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

## **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Dosering**

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

De standaarddosering is:

- 4 keer per dag spoelen met 10 ml mondspoeling. Begin na de ingreep en gebruik dit medicijn gedurende 2 tot 5 dagen, zolang de wond nog bloedt.

### **Wijze van gebruik**

Schud de mondspoeling goed om voor gebruik.

Meet met de maatbeker of spuit de voorgeschreven hoeveelheid af.

Spoel hiermee 2 minuten lang de mond.

Slik de vloeistof niet door. De mondspoeling kan soms ook gebruikt worden als drank. De mondspoeling als drank moet u doorslikken. Doe dit alleen als uw arts dit heeft voorgeschreven.

Na de ingreep moet u starten met het gebruiken van de mondspoeling.

In de meeste gevallen moet u dit middel gedurende 1 tot 2 weken gebruiken. Bij gebruik na tandheelkundige ingrepen en gebruik van een antistollingsmiddel moet u de mondspoeling 2 tot 5 dagen gebruiken.

### **Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.

### **Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

Als u dit middel 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 1 uur voor u de volgende dosis normaal gebruikt? Gebruik de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan een uur? Sla de vergeten dosis dan over.

### **Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn**

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

**Vaak** (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree.

**Soms** (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk en roodheid. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.
- Trombose (bloedstolsel in de vaten). Het effect van tranexaminezuur kan doorslaan, waardoor op andere plekken een bloedstolsel kan ontstaan. Vooral bedlegerige

patiënten hebben hier zeer zelden kans op. Dit is de reden dat mensen die al last hebben van trombose het vaak niet mogen gebruiken. In sommige gevallen kan het worden gecombineerd met een antistollingsmiddel, zoals heparine.

- Duizeligheid.
- Veranderingen in het zien, zoals kleurenblindheid. Waarschuw uw arts als u dit merkt. Deze bijwerking verdwijnt meestal weer als u stopt met het middel.
- Aanval met spierschokken en spierkrampen. Neem direct contact op met een arts.

### **Melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.

Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen (6 maanden).

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

De werkzame stof in dit medicijn is tranexaminezuur, overeenkomend met 50 mg tranexaminezuur per ml mondspoeling.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn propyleenglycol, methylparahydroxybenzoaat, citroenzuur-monohydraat, sorbitol en gezuiverd water.

### **Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Dit medicijn is helder en kleurloos. De mondspoeling is per 200 ml verpakt in een glazen fles.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### **Fabrikant:**

Savemaak C.V.  
Vilstersestraat 33  
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op [www.BijsluiterPlus.nl](http://www.BijsluiterPlus.nl) .

**Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in december 2023 door SaVeMaak C.V.**