

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Amlodipine suspensie 1 mg/ml niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Amlodipine suspensie 1 mg/ml niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Amlodipine suspensie 1 mg/ml niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat amlodipine. Amlodipine behoort tot een groep medicijnen die calciumblokkers worden genoemd. Amlodipine maakt uw bloedvaten wijder en verlaagt uw bloeddruk. Ook zal er meer zuurstof naar uw hart gaan.

Amlodipine suspensie 1 mg/ml niet FNA wordt gebruikt bij:

- Een hoge bloeddruk (hypertensie);
- Angina pectoris (pijnlijk en drukkend gevoel op de borst).

Amlodipine verlaagt uw bloeddruk binnen 6 weken. Ook uw andere klachten worden minder. Door het medicijn elke dag te gebruiken heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U heeft een zeer lage bloeddruk (hypotensie).
- U heeft een vernauwing van de aorta-hartklep (aortastenose) of cardiogene shock (een aandoening waarbij het hart onvoldoende bloed naar het lichaam pompt).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- U heeft recent een hartaanval gehad.
- U lijdt aan hartfalen.
- U heeft een sterke stijging van de bloeddruk (gehad).
- U heeft een leverziekte.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Amlodipine suspensie 1 mg/ml niet FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Amlodipine heeft invloed op andere medicijnen. Dit noemen we een wisselwerking.

Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. De belangrijkste wisselwerkingen van dit medicijn zijn met:

- Andere bloeddrukverlagers. De bloeddruk kan te laag worden als u amlodipine samen met andere bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen.
- Bepaalde medicijnen voor een vergrote prostaat, namelijk de alfa-blokkers alfuzosine, doxazosine en terazosine. Deze kunnen in het begin van de behandeling de bloeddruk verlagen en duizeligheid veroorzaken. Amlodipine versterkt deze bijwerking. Deze wisselwerking is alleen van belang de eerste dagen dat u met een alfa-blokker begint. U kunt de alfa-blokker de eerste keren het beste 's avonds innemen, als u al op bed zit, voor het geval u duizelig wordt. Als u een alfa-blokker met vertraagde afgifte gebruikt, kunt u de volgende ochtend duizelig worden bij het opstaan. Dit is na enkele dagen over.
- Cimetidine (maagmiddel), claritromycine en erytromycine (antibiotica), fluoxetine (medicijn tegen depressie) en fluconazol, itraconazol, ketoconazol en voriconazol (antischimmelmiddelen). Deze medicijnen kunnen de hoeveelheid amlodipine in het bloed verhogen. Hierdoor kan amlodipine meer bijwerkingen geven, zoals hoofdpijn, blozen en duizeligheid. Ook kan uw lichaam te veel vocht vast gaan houden (oedeem). Neem bij deze gevallen contact op met uw arts.
- Sommige medicijnen tegen hiv (het virus waar u aids van kunt krijgen) en hepatitis C (een vorm van leverontsteking). Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als amlodipine. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter niet gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wijze van gebruik

Schud de drank goed om voor gebruik.

Meet de voorgeschreven hoeveelheid af met een maatbeker, maatlepel of doseerspuit.

Neem de drank in.

Wanneer?

U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip, bij voorbeeld 's ochtends bij het ontbijt, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u in het begin veel last van duizeligheid heeft, kunt u het ook 's avonds voor het naar bed gaan innemen.

Hoelang?

- Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.
- Angina pectoris (pijnlijk en drukkend gevoel op uw borst). Waarschijnlijk moet u dit medicijn langdurig gebruiken. Overleg hierover met uw arts.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

- U gebruikt amlodipine 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

- Hoge bloeddruk
Stop niet zomaar zelf met dit medicijn. Overleg altijd eerst met uw apotheker en arts als u wilt stoppen. U moet dit medicijn namelijk afbouwen, dat betekent dat u dit medicijn niet in 1 keer mag stoppen. Als u in 1 keer stopt of als u te snel stopt, kan uw bloeddruk weer omhoog gaan.
- Hartkramp
Gebruikt u dit medicijn tegen hartkramp, dan is er een kleine kans dat u een aanval krijgt. Het is daarom verstandig langzaam af te bouwen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Oedeem (vochtophoping). Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Hoofdpijn, warmtegevoel, blozen en, zeer zelden, hartkloppingen.

- Spierkramp en zeer zelden spierpijn, pijn in de rug en gewrichtspijn. Als u aan de spierziekte myasthenia gravis lijdt: u kunt meer last krijgen van deze ziekte.
- Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.
- Wazig zien.
- Slaperigheid, vermoeidheid en een zwak gevoel.
- Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree of verstopping. Zeer zelden opkomend maagzuur (reflux). Mensen met langdurige klachten van zuurbranden kunnen meer klachten krijgen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Slapeloosheid, depressiviteit, stemmingswisselingen, in de war zijn (verwardheid) en angstgevoelens.
- Smaakveranderingen
- Droge mond en tandvleesproblemen. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen.
- Trillende handen en een doof of tintelend gevoel in de ledematen.
- Vaker moeten plassen.
- Borstvorming bij mannen en impotentie (erectiestoornissen).
- Loopneus, kortademigheid en oorsuizen.
- Haaruitval, huiduitslag, jeuk, overmatig zweten en huidverkleuring. Als u de huidziekte psoriasis heeft: de klachten kunnen verergeren.
- Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten, soms treedt ook koorts op. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht, tong, lippen, mond of keel. Ook kan zeer zelden een ernstige huidafwijking ontstaan, met blaren op de huid of een vuurrode huid.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is amlodipine (als besilaat, uit amlodipine 10 mg tabletten), overeenkomend met 1 mg amlodipine per ml suspensie.

De andere stoffen (hulpstoffen) in de amlodipine 10 mg tabletten zijn calciumwaterstoffosfaat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat.

De andere stoffen die in de suspensie zitten komen uit Syrspend SF PH4 suspending base: gemodificeerd zetmeel, natriumcitraat, citroenzuur, sucralose, natriumbenzoaat, appelzuur, simethicon.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is helder tot een beetje troebel. De suspensie is per 100 ml verpakt in een ondoorschijnende, kunststoffen fles.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in december 2023 door SaVeMaak C.V.