

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Azelaiïnezuurcrème 20% FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Azelaiïnezuurcrème 20% FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Azelaiïnezuurcrème 20% FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat azelaiïnezuur. Azelaiïnezuur behoort tot een groep medicijnen die depigmentatiemiddelen worden genoemd. Azelaiïnezuur verweekt het buitenste laagje van de huid (hoornlaag). Ook remt het de groei van bacteriën en zorgt het dat de huid minder kleurstof maakt.

Azelaiïnezuurcrème 20% FNA wordt gebruikt bij:

- Acne, een huidaandoening van de talgkliertjes met puistjes en mee-eters;
- Rosacea, een huidaandoening met roodheid, ontsteking, verdikking en puisten;
- Hyperpigmentatie, een donkere huidverkleuring. Het wordt hierbij gebruikt om de huid te bleken. Hyperpigmentatie kan ontstaan na een ontstekingsreactie, tijdens de zwangerschap (zwangerschapsmasker = melasma) en tijdens gebruik van de anticonceptiepil in combinatie met zonlicht.

Hoe snel het werkt, hangt af van uw aandoening.

- Acne: de eerste 3 tot 4 weken verergert het, daarna verdwijnen de puistjes geleidelijk in enkele maanden.
- Rosacea: roodheid en puistjes verdwijnen binnen enkele weken.
- Hyperpigmentatie: vlekken worden lichter na 2 tot 3 maanden.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiting.
- Uw huid is beschadigd op de plekken waar u de crème moet aanbrengen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Bij smeren rondom de ogen: laat de crème niet in de ogen of op de oogleden komen.
- Zorg dat het middel niet in de ogen, de neus, de mond of in een wondje komt, want dat geeft irritatie. Komt het middel hier per ongeluk in terecht, spoel dan direct met veel water.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast azelaïnezuur nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de ingesmeerde plekken. U heeft dan kans dat u dit middel met het volgende weg smeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette middel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere middel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.

Kijk uit met andere huidmiddelen die irriterend kunnen werken, zoals lotions waarin alcohol is verwerkt.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Gebruikt u dit medicijn tegen een zwangerschapsmasker? Gebruik het dan na de zwangerschap en als u geen borstvoeding meer geeft.

Borstvoeding

Gebruik dit medicijn niet als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wijze van gebruik

Maak de huid schoon met lauw water en zeep voordat u dit middel aanbrengt. Laat de huid gedurende een kwartiertje drogen, om irritatie van de huid door het middel zo veel mogelijk te voorkomen. Breng de crème vervolgens dun aan. Was uw handen na aanbrengen met zeep.

Let op bij gebruik in de buurt van de ogen, neus, mond of beschadigde huid: Het middel mag niet in het oog of op de oogleden komen. Breng niet aan op een beschadigde huid, door de zon verbrande huid of op slijmvliezen. Komt het per ongeluk toch in het oog, de neus, mond of een wondje? Spoel dan goed met water om het middel te verwijderen. Raadpleeg uw arts als de irritatie aanhoudt.

Bij gebruik tegen donkere vlekken: smeer de crème alleen op de donker gekleurde vlekken.

Bij gebruik bij acne of rosacea: zonlicht in combinatie met dit medicijn kan lichte vlekken op de huid veroorzaken. Breng dit medicijn daarom 's avonds aan en gebruik overdag een zonnebrandcrème.

Hoelang moet u deze crème gebruiken?

- Acne: de eerste 4 weken kan de acne verergeren. Na ongeveer 2 maanden is te beoordelen of het goed werkt. Als het medicijn werkt wordt het meestal 3 tot 6 maanden gebruikt.
- Rosacea: u moet dit medicijn zolang als nodig is gebruiken. Ziet u na enkele maanden gebruik nog geen verbetering? Overleg dan met uw arts. Mogelijk kan uw arts een ander medicijn voorschrijven.
- Donkere huidverkleuring: u moet 2 tot 3 maanden met de behandeling doorgaan. Dan is te zien hoe goed dit medicijn werkt tegen de verkleuring. U gebruikt dit medicijn niet langer dan 6 maanden.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Een keer vergeten is niet zo erg. Probeer zo veel mogelijk uw normale schema te volgen, dan heeft u sneller resultaat. Smeer nooit een dubbele dosis.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. De huidaandoening kan enige tijd later wel weer terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Jeuk, branderig of prikkelend gevoel en tintelingen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Irritatie van de huid: u heeft dan last van roodheid, droge huid en schilfering.
- Uw huid kan gevoeliger worden voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp).
- Lichte vlekken op de huid.
- Allergische reactie op dit medicijn. Dit merkt u aan jeuk en huiduitslag of bulten. In ernstige gevallen aan benauwdheid.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is azelaïnezuur, overeenkomend met 200 mg werkzame stof per gram crème.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn propyleenglycol en lanettecrème FNA. De hulpstoffen die in lanettecrème FNA zitten zijn sorbinezuur, cetostearylalcohol B emulgerend, decyloleaat en sorbitol.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is wit van kleur. De crème is per 30 gram verpakt in een tube.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.