

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Kaliumchloride drank 75 mg/ml FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Kaliumchloride drank 75 mg/ml FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Kaliumchloride drank 75 mg/ml FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat kaliumchloride. Kaliumchloride bevat kalium, een mineraal. Mineralen zijn nodig voor allerlei lichaamsfuncties. Ons lichaam kan deze stoffen zelf niet aanmaken. Daarom moeten we ze via ons voedsel binnenkrijgen. Als dit niet voldoende lukt kan het helpen om mineralen via medicijnen te gebruiken om de tekorten op te heffen.

Kaliumchloride drank 75 mg/ml FNA wordt gebruikt bij:

- Tekort aan kalium in het lichaam.

Het kan enkele dagen tot weken duren voor het effect van de drank merkbaar is.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

- U heeft zweertjes in de slokdarm, maag of darmen.
- U heeft te veel kalium of chloride in het lichaam.
- U heeft een ernstige verminderde nierfunctie.
- U heeft onbehandelde slecht werkende bijnierschors (ziekte van Addison).
- Er is sprake van acute uitdroging (dehydratie).
- U heeft metabole acidose (verzuring van het lichaam).
- Er is sprake van een obstructie van het maagdarmkanaal.
- U heeft ernstige weefselbeschadiging zoals bij ernstige brandwonden.
- U heeft het crush-syndroom.
- Er is sprake van hemolyse.
- U heeft last van hittekrampen.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Kaliumchloride drank 75 mg/ml FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Kaliumchloride heeft invloed op andere medicijnen. Dit noemen we een wisselwerking. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. De belangrijkste wisselwerkingen van dit medicijn zijn met:

- De hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers en de groep Angiotensine-II-blokkers en de kaliumsparende plasmiddelen spironolacton, triamteren, amiloride en eplerenon. Bij combinatie met kaliumchloride kan de hoeveelheid kalium in uw bloed te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritme stoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.

Borstvoeding

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wijze van gebruik

- Schud de drank goed om voor gebruik.
- Meet de voorgeschreven hoeveelheid af met een maatbeker, maatlepel of doseerspuit. Neem de drank in. Indien u de smaak vies vindt, kunt u de drank verdunnen met water of vruchtensap.
- Drink een slok water of spoel uw mond na met wat water. De drank bevat suiker en op deze manier is er minder kans op tandbederf.
- Neem de drank met wat eten in, tijdens of net na de maaltijd. Dit vermindert de kans op maagklachten.
- Meestal gebruikt u dit medicijn 2 of 3 keer per dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, bijvoorbeeld tijdens het ontbijt en de avondmaaltijd.

Hoelang u dit medicijn moet gebruiken is afhankelijk van hoeveel kaliumtekort u heeft. De arts zal regelmatig uw bloed controleren. Meestal moet u dit medicijn enkele weken tot maanden gebruiken.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

- Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
- Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. De hoeveelheid kalium in het bloed kan dan wel weer langzaam dalen. Stop alleen na overleg met uw arts. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Maag-darmklachten, zoals misselijkheid, braken, maagpijn, diarree en winderigheid. De drank innemen tijdens of na het eten vermindert de kans op deze bijwerkingen.
- Te veel kalium in uw bloed (hyperkaliëmie). Dit merkt u meestal niet.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Zweetjes in slokdarm, maag of darmen. Dit merkt u aan bloederige diarree of zwarte, teerachtige ontlasting. Stop dan met het gebruik en neem contact op met een arts. Bij een maagbloeding kan het voorkomen dat u bloed braakt. Neem dan direct contact op met een arts.
- Overgevoeligheid voor een van de hulpstoffen. Dit kan uw merken aan huiduitslag met galbulten en jeuk. Neem dan contact op met uw arts.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen (6 maanden).

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is kaliumchloride, overeenkomend met 75 mg kaliumchloride per ml drank.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn propyleenglycol, methylparahydroxybenzoaat en pepermuntolie.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is helder en kleurloos. De drank is per 300 ml verpakt in een fles.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in december 2023 door SaVeMaak C.V.