

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Lidocaïne-levomentholgel FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is lidocaïne-levomentholgel FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is lidocaïne-levomentholgel FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat lidocaïne en levomenthol. Lidocaïne behoort tot een groep medicijnen die anesthetica worden genoemd. Dit zijn verdovende middelen. Lidocaïne maakt de huid plaatselijk gevoelloos. Het vermindert ook pijn en jeuk. Levomenthol verwijdert de bloedvaten. Dit geeft een verkoelend en licht verdovend effect op de huid. Deze medicijnen versterken elkaars werking.

Lidocaïne-levomentholgel FNA wordt gebruikt bij:

- Jeuk, bijvoorbeeld door de processierups, bij muggenbeten, galbulten of waterpokken;
- Pijn van oppervlakkige schaafwonden en oppervlakkige brandwonden.

Uw klachten worden meestal minder binnen een paar minuten.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U heeft een ziekte van de stofwisseling (porfyrie).
- Op open wonden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Bij kinderen jonger dan 2 jaar. Dit medicijn mag dan niet in het gezicht worden aangebracht.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast lidocaïne-levomentholgel nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U kunt dit medicijn veilig gebruiken samen met andere medicijn.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.

Borstvoeding

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft, maar niet op de tepels. Lidocaïne kan de mond van de zuigeling gevoelloos maken. Zuigelingen kunnen het bewustzijn verliezen na het inademen van levomenthol. Als u dit middel tegen pijnlijke tepels gebruikt, breng het dan direct na de voeding aan en was het voor de volgende voeding weer af, zodat de baby het niet in de neus en/of mond krijgt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

De standaarddosering is:

- Behalve als uw arts anders voorschrijft: breng de gel 1 tot 2 keer per dag dun aan op de pijnlijke of jeukende plekken, zo nodig vaker.

Heeft u dit middel langer dan twee weken nodig? Raadpleeg dan uw arts.

Bij kinderen jonger dan 2 jaar niet in het gezicht aanbrengen.

Wijze van gebruik

Smeer het middel dun op de jeukende of pijnlijke plekken. Smeer het alleen op een intacte huid, dus niet op open plekken en wondjes. Het remt namelijk de genezing van wondjes.

Was na gebruik uw handen.

Zorg er altijd voor dat dit middel niet in uw oog komt. Als dit toch gebeurt, reinig uw oog met veel water.

Gebruik bij voorkeur een vingercondoom, dit is een hoesje dat u over de vinger kunt aanbrengen. Het is verkrijgbaar in de apotheek.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u te veel van dit medicijn heeft aangebracht kunt u de overvloedige hoeveelheid afvegen. Krijgt u hierna klachten? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Heeft u het middel nog nodig? Gebruik het dan alsnog.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Overgevoeligheid. Dit kunt u merken door klachten zoals sterke jeuk, roodheid, zwelling of uitslag.

- Ademhalingsstilstand bij kleine kinderen. Gebruik dit medicijn daarom niet in het gezicht van kinderen jonger dan 2 jaar.
- Slechte genezing van wonden als er menthol op is gesmeerd. Dit medicijn mag u niet gebruiken op open wonden.
- Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stoffen in dit medicijn zijn lidocaïne en levomenthol. Elke gram gel bevat 10 mg lidocaïne en 10 mg levomenthol.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn propyleenglycol (conserveermiddel), carbomeer 974P, dinatriumedetaat, polysorbaat 80, sorbitanoleaat en trometamol.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De gel is wit van kleur. De gel is per 30 gram verpakt in een tube.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.