

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Lorazepamdrank 1 mg/ml FNA**

**Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van de bijsluiter**

1. Wat is Lorazepamdrank 1 mg/ml FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Lorazepamdrank 1 mg/ml FNA en waarvoor wordt het gebruikt?**

Dit medicijn bevat lorazepam. Lorazepam behoort tot een groep medicijnen die benzodiazepinen worden genoemd. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen.

Lorazepamdrank 1 mg/ml FNA wordt gebruikt bij kinderen met:

- Angstgevoelens en gespannenheid;
- Epilepsie;
- Onrust, bijvoorbeeld op de intensive care en bij ernstige opwinding of ernstige onrust.

Lorazepamdrank 1 mg/ml FNA wordt gebruikt bij volwassenen met:

- Angstgevoelens en gespannenheid;
- Paniekstoornissen;
- Slapeloosheid;
- Epilepsie;
- Alcoholontwenning;
- Onrust, bijvoorbeeld voor een operatie;
- Misselijkheid door chemokuren.

Lorazepam werkt binnen 1 uur na inname. Het effect houdt 8 tot 12 uur aan.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

## **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?**

### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Bij kinderen jonger dan 1 maand.
- U heeft de spierziekte myasthenia gravis.
- U lijdt aan een ernstige ademhalingsstoornissen (respiratoire insufficiëntie).
- U lijdt aan een toestand van niet of onregelmatig ademen tijdens de slaap (slaap apnoe syndroom).
- U heeft een ernstig verminderde leverfunctie.
- U heeft COPD.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

- U centraal zenuwstelsel is beschadigd.
- Alcohol- of drugsgebruik (in het verleden) vanwege mogelijke afhankelijkheid.
- Bij ouderen.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Lorazepamdrank 1 mg/ml FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Lorazepam heeft invloed op andere medicijnen. Dit noemen we een wisselwerking. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. De belangrijkste wisselwerkingen van dit medicijn zijn met:

- Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Dan kan lorazepam nog langer dan 3 dagen doorwerken. U kunt dan bijvoorbeeld nog langer geen autorijden.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Waarop moet u letten met alcohol?**

Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en een verminderde coördinatie.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

#### *Zwangerschap*

Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent. Of als u dit binnenkort wilt worden. Bij gebruik voor lange tijd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap (3e trimester) kunnen bij de baby ontweningsverschijnselen ontstaan. En bij gebruik in een hoge dosis vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft met ademen. Gebruik dit medicijn daarom alleen als het echt nodig is. En zo kort mogelijk in een lage dosis. Weeg samen met uw arts de ernst van uw ziekte af tegen het risico voor het kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) een ander medicijn gebruiken.

Eenmalig gebruik tijdens een epilepsie-aanval is mogelijk. Overleg hierover met uw arts.

#### *Borstvoeding*


Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts.

- Gebruikt u dit medicijn voor lange tijd? U kunt dit medicijn beter niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Er kunnen ontweningsverschijnselen ontstaan bij de baby zodra u met dit medicijn stopt. Misschien kan uw arts u tijdelijk een ander medicijn voorschrijven, dat wel veilig is voor de baby. Of u kunt kunstvoeding geven.
- Gebruikt u dit medicijn af en toe? Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Hierdoor is er een klein risico op bijwerkingen bij het kind. Dit merkt u doordat uw baby suf wordt en minder goed drinkt. Als uw arts vindt dat u borstvoeding kunt geven: let dan goed op deze bijwerkingen. Als deze bijwerkingen optreden, neem dan contact op met uw arts.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

Let op! Epilepsie kan een reden zijn om geen auto te rijden. Vraag dit aan uw arts.



### 3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Gebruikt u dit middel als slaapmiddel? Het werkt dan alleen goed als u het af en toe gebruikt. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af. Uw lichaam went dan aan het effect.

#### Wijze van gebruik

Schud de drank goed om voor gebruik.

Meet de voorgeschreven hoeveelheid af met een maatbeker, maatlepel of doseerspuit.

Neem de drank in.

Wanneer moet u de drank innemen?

- Angst en spanning en paniekstoornis  
Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag, dus ongeveer om de 8 tot 12 uur.  
Gebruikt u dit medicijn alleen in speciale gevallen, zoals bij vlieg angst? Neem het dan minstens een half uur van tevoren in.
- Slapeloosheid  
Neem het medicijn 1 uur voor u wilt gaan slapen in. Neem het alleen als u na inname minstens 8 uur de tijd heeft om te slapen. Als u voor die tijd wakker moet worden, zult u nog te veel last van de versuffende werking hebben.
- Epilepsie  
U moet dit medicijn gebruiken als de epilepsie-aanval langer dan 5 minuten duurt.
- Alcoholontwenning  
De eerste ontwenningverschijnselen ontstaan meestal binnen 12 uur. Neem voor

die tijd de eerste dosis in. Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag, dus ongeveer om de 8 tot 12 uur.

- Chemotherapie  
U gebruikt dit medicijn vlak voordat u begint met de chemo.
- Medische ingrepen of onderzoeken  
Uw arts heeft aangegeven hoeveel tijd van te voren u dit medicijn moet innemen. Dat is vaak 1-2 uur voorafgaand aan de ingreep of het onderzoek. Zorg dat u na inname niet meer zelf moet reizen. Dit middel beïnvloedt namelijk de rijvaardigheid.

Hoelang moet u de drank innemen?

- Angst of spanning  
Gebruik langer dan 2 maanden achter elkaar wordt sterk afgeraden. Er is dan te veel kans dat u afhankelijk van dit middel wordt. Dit betekent dat u ontwenningsverschijnselen krijgt als u stopt met het gebruik. Probeer ook op een andere manier uw angst en spanning te verminderen. Vraag uw arts om advies. Gebruikt u dit medicijn samen met een antidepressivum? Dan is het meestal de bedoeling dat u binnen enkele weken afbouwt, omdat dan het antidepressivum begint te werken.
- Paniekstoornis of algemene angststoornis  
De behandeling duurt vaak een half jaar tot een jaar. Daarna moet u de dosering gedurende 3 maanden afbouwen.
- Slapeloosheid  
Als u dit medicijn af en toe eens gebruikt kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties. Bij dagelijks gebruik gedurende meer dan twee weken, heeft u kans op 'ontwenningslappeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van dit medicijn om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Gebruik het in elk geval niet langer dan 4 weken achter elkaar.
- Epilepsie  
Meestal stopt de aanval als u dit medicijn 1 keer gebruikt. Soms is het nodig om dit medicijn nog een aantal keer te gebruiken.
- Alcoholontwenning  
De ontwenningsverschijnselen bij een alcoholverslaving zijn meestal na ongeveer 2 dagen verdwenen. Daarna kunt u het gebruik van het middel in enkele dagen afbouwen.

### **Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.

### **Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

- Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

- Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

#### *Angst, spanning of paniekaanvallen*

Het is niet schadelijk als u een dosis mist. Maar als u het medicijn al enkele weken gebruikt, bent u er aan gewend geraakt en kunt u bij de vergeten tablet last krijgen van ontwenningssverschijnselen. Bent u gewend 2 of 4 keer per dag een tablet te slikken, en heeft u er een vergeten? Neem nooit een dubbele dosis. Wel kunt u de tablet inhalen, als u de volgende tablet minstens 3 uur later inneemt.

#### *Slapeloosheid*

Kunt u 's nachts niet slapen en wilt u alsnog een slaapmiddel innemen? Dit kan, maar houd er rekening mee dat het slaapmiddel lang blijft werken. U kunt dan moeilijk wakker worden en hebt overdag een verminderd reactievermogen. Er bestaan slaaptabletten die korter werken. Neem contact op met uw arts, mogelijk kan hij u een korterwerkend slaapmiddel voorschrijven voor deze situaties.

#### *Voorkomen van ziekteverschijnselen bij alcoholontwenning*

Het is belangrijk dit middel consequent te gebruiken.

#### **Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn**

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

Als u dit medicijn slechts enkele dagen achter elkaar heeft gebruikt, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan over het algemeen geen ontwenningssverschijnselen op.

Heeft u het langere tijd gebruikt? Dan is de volgende informatie voor u belangrijk.

Bij gebruik overdag:

- Na een aantal weken tot maanden gebruik kunt u gewend zijn geraakt aan het gevoel dat dit medicijn u geeft. U durft dan bijvoorbeeld alleen nog met het middel de deur uit. Mocht u dit merken, neem dan contact op met uw arts voor een advies over het afbouwen van het gebruik.
- Na een gebruik van enkele weken tot maanden moet u langzaam afbouwen. Bij plotseling stoppen heeft u kans dat binnen enkele dagen ontwenningssverschijnselen ontstaan. Bijvoorbeeld hartkloppingen, slapeloosheid, angst, prikkelbaarheid, een gejaagd gevoel, spierkrampen, trillen en overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking.
- Deze ontwenningssverschijnselen zijn moeilijk te onderscheiden van angst- en spanningsklachten. Het lijkt dan alsof de klachten waar u dit medicijn oorspronkelijk voor kreeg terugkomen. Start dan niet opnieuw met het medicijn, maar probeer op een andere manier van uw klachten af te komen. U heeft anders kans in een vicieuze cirkel terecht te komen.
- Als u de dosis gedurende enkele weken tot maanden verlaagt, heeft u geen of minder last van ontwenningssverschijnselen. Vraag uw arts of apotheker om advies over een

goed afbouwschema. Soms kunt u beter eerst overstappen op een ander kalmeringsmiddel, waar makkelijker mee is af te bouwen.

Bij gebruik als slaapmiddel:

- Heeft u dit medicijn meer dan 2 weken achter elkaar als slaapmiddel gebruikt, en gebruikt u het dan opeens niet meer? Dan heeft u kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van het slaapmiddel om in slaap te vallen. In het begin gaat het slapen daardoor weer moeilijker. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Heeft u het wel langere tijd gebruikt? Bouw de dosering dan langzaam af.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

**Zeer vaak** (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Vermoeidheid, sufheid en slaperigheid.

**Vaak** (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Verminderde coördinatie.
- Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren.
- Wazig zien of dubbelzien.
- Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen.
- Snurken door verslapping van de huid.
- Vallen.
- Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn, in de war zijn (verwardheid).
- Afname van gevoelens.
- Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken.
- Veranderde eetlust.
- Hoofdpijn en duizeligheid.
- Zweten en hartkloppingen.
- Droge ogen.
- Huiduitslag en jeuk.
- Afhankelijkheid.
- Verminderde werkzaamheid als slaapmiddel.

**Soms** (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Nachtmerries.

- Onrust en prikkelbaarheid.
- Waandenkbeelden en hallucinaties.
- Geheugenverlies.
- Depressieve gevoelens.
- Minder zin in seks.
- Problemen met ademen.

### **Melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

### **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Bewaar dit medicijn in de koelkast (2-8°C).  
Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen (6 maanden).

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

### **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

#### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

De werkzame stof in dit medicijn is lorazepam, overeenkomend met 1 mg lorazepam per ml drank.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn propyleenglycol, macrogol 400, sinaasappel essence en glycerol.

#### **Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Dit medicijn is helder en kleurloos. De drank is per 100 ml verpakt in een ondoorschijnende fles met doseergarnituur.

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

##### **Fabrikant:**

Savemaak C.V.  
Vilstersestraat 33  
8152 AA Lemelerveld



Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op [www.BijsluiterPlus.nl](http://www.BijsluiterPlus.nl) .

**Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in december 2023 door SaVeMaak C.V.**