

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Salicylzuur 10% in waterafwasbare lanettezalf niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Salicylzuur 10% in waterafwasbare lanettezalf niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Salicylzuur 10% in waterafwasbare lanettezalf niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat salicylzuur. Salicylzuur behoort tot een groep medicijnen die keratolytica worden genoemd. Salicylzuur maakt het bovenste laagje van de huid week. Hierdoor laten schilfers makkelijker los. Het werkt ook licht ontsmettend.

Salicylzuur 10% in waterafwasbare lanettezalf niet FNA wordt gebruikt bij:

- Droge, schilferende huidaandoeningen. Bijvoorbeeld ernstig eczeem, ichthyosis (schubbenziekte) en psoriasis (een huidziekte met schilferende rode plekken).

U merkt binnen een paar dagen dat uw huid minder dik is en dat de schilfers minder worden.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Bij kinderen. U mag deze zalf bij kinderen alleen op kleine plekjes gebruiken. Dus niet op grote huidoppervlakken.
- Bij een kind met een virusinfectie, zoals de griep of waterpokken.
- Pas op met contact met ogen, slijmvliezen, gezicht en genitaliën. Probeer contact te vermijden.
- U gebruikt de zalf op armen of benen en heeft een verminderde doorbloeding.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Salicylzuur 10% in waterafwasbare lanettezalf niet FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de aangedane plekken. U heeft dan kans dat u dit medicijn met het volgende weg smeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette huidmiddel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere huidmiddel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.

Gebruik op de behandelde plekken alleen andere huidmiddelen na overleg met uw arts of apotheker.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

In kleine hoeveelheden kunt u dit medicijn veilig gebruiken tijdens de zwangerschap gedurende maximaal twee weken. Bijvoorbeeld op een of twee plekken ter grootte van een handpalm. Het heeft dan geen nadelige gevolgen voor het kind.

Wilt u dit medicijn langer gaan gebruiken of op meerdere plekken die groter zijn dan een handpalm waarop u het wilt aanbrengen? Overleg dan eerst met uw arts of apotheker.

Borstvoeding

U kunt veilig borstvoeding geven, als u dit medicijn in kleine hoeveelheid gebruikt. Dus op een onbeschadigde huid of op een klein huidoppervlak. Er komt dan een te verwaarlozen hoeveelheid in de moedermelk terecht. Dit medicijn wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Breng dit medicijn niet aan op de borst of rond de tepel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar: 1 of 2 keer per dag dun aanbrengen op de aangedane plek.

Bij kinderen onder de 12 jaar alleen kleine plekje behandelen, zoals de ellebogen.

Wijze van gebruik

- Smeer de zalf in een dunne laag op de plekken.
- Dek eventueel af met een droog verband.
- Soms adviseert de arts om een paar dagen lang de huid af te dekken met folie of tape. Dat versterkt het effect.
- Zorg dat de zalf niet komt in de ogen, neus, mond, op slijmvliezen of een beschadigde huid. Het kan daar irritatie geven. Spoel in dat geval met veel water.

Op kleine oppervlakken, zoals de ellebogen: niet langer dan enkele weken achter elkaar gebruiken. Bij kinderen niet langer dan enkele dagen gebruiken.

Op grotere huidoppervlakken: niet langer dan 2 weken achter elkaar gebruiken. Moet u de zalf langer dan enkele weken gebruiken? Overleg dan met uw arts.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Heeft u per ongeluk meer of vaker gebruikt dan de bedoeling was? Voor een keer is dit niet ernstig. Consequent te veel gebruiken of te langdurig gebruik kan vervelende bijwerkingen veroorzaken. Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Bent u vergeten de zalf aan te brengen? Doe dat dan alsnog. Wacht daarna een paar uur voor u het weer aanbrengt. Breng geen dubbele hoeveelheid zalf aan om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Prikkeling of een branderig gevoel. Dit verdwijnt meestal binnen enkele minuten.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Overgevoeligheid voor dit medicijn of een van de stoffen in deze zalf. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

Bij gebruik op grote oppervlakken of langdurig op kleine oppervlakken, is er kans op te veel salicylzuur in het bloed. Dit kan bijwerkingen geven, zoals misselijkheid. Vooral kleine kinderen zijn hier gevoelig voor. De kans hierop is groter bij een langduriger gebruik (meerdere weken) en als u de behandelde huid afdekt met plastic folie of tape.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen (3 maanden).

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is salicylzuur, overeenkomend met 100 mg werkzame stof per gram zalf.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn decylis oleas (Cetiol V), witte vaseline, paraffine, isopropylmyristaat en cetostearylalcohol B.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is wit van kleur. De zalf is per 100 gram verpakt in een tube.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.