

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Clobetasol propionaat 0,025-0,05% mondspoeling niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Clobetasol propionaat 0,025-0,05% niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Clobetasol propionaat 0,025%-0,05% niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat clobetasol. Clobetasol werkt hetzelfde als een hormoon dat uw eigen lichaam maakt (cortisol). Deze hormonen zijn ingedeeld in sterktes. De clobetasol in deze mondspoeling is 'zeer sterk werkend'. Het stopt de ontsteking. Hierdoor doen de zweertjes minder pijn.

Clobetasol propionaat 0,025-0,05% niet FNA wordt gebruikt bij:

- Pijnlijke zweertjes in de mond die niet over willen gaan. Bijvoorbeeld door: lichen planus in de mond, aften, de ziekte van Crohn, systemische lupus erythematoses (SLE), pemfigus, parapemfigus, het Stevens-Johnson Syndroom (SJS) of toxische epidermale necrolyse (TEN).

Uw klachten worden meestal minder binnen een paar dagen. Het kan een paar weken duren voor alle zweertjes zijn verdwenen.

Bij lichen planus: clobetasol geneest deze ziekte niet, maar het kan er wel voor zorgen dat u er minder last van heeft.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U heeft in uw mond of op uw lippen een infectie met een virus. Bijvoorbeeld een koortslip.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- U bent allergisch voor een ander bijnierschors hormoon dan clobetasol.
- U heeft glaucoom (te hoge druk in het oog). Dit kan erger worden als u de mondspoeling meerdere weken gebruikt.
- U heeft in uw mond last van een infectie met een bacterie, schimmel of parasiet. Bijvoorbeeld spruw.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Clobetasol propionaat 0,025-0,05% niet FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Overleg met uw arts voor u andere medicijnen gebruikt om mee te spoelen of om in uw mond te smeren.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Van dit medicijn is nog niet bekend of het veilig is voor de baby. Overleg met uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Borstvoeding

Gebruik deze mondspoeling niet als u ook borstvoeding geeft. Of geef geen borstvoeding. Het medicijn komt in de moedermelk en kan bijwerkingen geven bij de baby. Overleg met uw arts als u borstvoeding wilt geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

De standaarddosering is:

- Volwassenen en kinderen:
 - De eerste paar dagen: 3 keer per dag spoelen. Doe dit telkens na het eten of voor u gaat slapen. Het medicijn kan dan een tijdje inwerken tot u weer gaat eten of drinken.
 - Na de eerste paar dagen 1 keer per dag spoelen. Doe dit voor u naar bed gaat.

Wijze van gebruik

- Schud de fles elke keer voordat u de mondspoeling gebruikt.
- Schenk in het maatbekertje de juiste hoeveelheid. Hoeveel dat is, staat op het etiket van de apotheek. Meestal moet u spoelen met 10 ml vloeistof.
- Doe de mondspoeling in uw mond, maar slik niet door. Beweeg de vloeistof goed door uw mond, zodat het met alle plekken in contact komt. Probeer de vloeistof minstens 1 minuut in uw mond te houden.
- Spuug de vloeistof daarna uit.
- Wacht na het spoelen minstens een half uur voor u gaat eten, drinken, uw tanden poetsen of uw mond spoelen.
- Heeft u in uw mond te veel last van de vloeistof? Schenk dan een beetje limonadesiroop bij de vloeistof in het maatbekertje. Dat helpt vaak.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Heeft u de mondspoeling vaker gebruikt dan de bedoeling was? Of heeft u hem per ongeluk ingeslikt? Voor een keer is dit is niet ernstig. Maar als u het vaak te veel gebruikt of als u het vaak inslikt, kunt u vervelende bijwerkingen krijgen.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Bent u een keer vergeten de mondspoeling te gebruiken? Dat is niet erg, spoel dan toch zodra u eraan denkt.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Pijn in de mond tijdens en net na het spoelen. Dit komt door de alcohol. Heeft u hier veel last van? Doe dan vlak voor het spoelen een beetje limonadesiroop bij de mondspoeling in het maatbekertje.
- Infecties in de mond, vooral candida-infecties (spruw) of koortslip (herpesvirus-infecties). De infecties ontstaan doordat clobetasol de natuurlijke weerstand in uw mond tegenwerkt. Bovendien merkt u een infectie minder goed. Dat komt doordat de mondspoeling wel werkt tegen de pijn, zwelling en jeuk, maar niet tegen de virus, bacterie of schimmel. Een candida-infectie (spruw) ziet u aan een wit laagje in uw mond. Soms schrijft de arts meteen al een medicijn voor om ervoor te zorgen dat u deze infecties niet krijgt.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Allergische reactie. Dit merkt u aan roodheid, bulten of jeuk. Of u merkt dat uw klachten niet overgaan. Overleg met een arts als u hier last van heeft.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Glaucoom (te hoge oogbaldruk). Dit kan ontstaan als clobetasol via het slijmvlies van uw mond in uw oog komt. Of als u vaak in uw ogen wrijft nadat de vloeistof op uw handen is gekomen. Neem meteen contact op met uw arts als u minder of wazig gaat zien of als u pijn in uw oog krijgt.

Gebruikt u dit medicijn meerdere weken?

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Dunner slijmvlies in de mond. Hierdoor heeft u sneller wondjes en bloedingen in uw mond. Bijvoorbeeld bloedend tandvlees.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Een voller gezicht. Overleg met uw arts als u dit merkt.
- Bij vrouwen mannelijke haargroei. Bij mannen meer haargroei. Overleg met uw arts als u dit merkt.
- Kinderen kunnen minder hard groeien. Bij hen meet de arts daarom soms hun lengte. Na stoppen haalt het kind de groei meestal weer in.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is clobetasol propionaat, overeenkomend met 0,25 mg (0,025%) of 0,5 mg (0,05%) clobetasol propionaat per ml mondspoeling.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn 96% ethanol, sorbitol en frambozenessence.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is helder en kleurloos. De mondspoeling is per 300 ml verpakt in een ondoorschijnende fles.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in december 2023 door SaVeMaak C.V.