

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Monochloorazijnzuur oplossing 83,8% niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Monochloorazijnzuur oplossing 83,8% niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Monochloorazijnzuur oplossing 83,8% niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat monochloorazijnzuur. Monochloorazijnzuur werkt etsend op de huid. Het maakt de huidcellen kapot. Hierdoor kan het virus dat wratten veroorzaakt uit de huid komen. Het lichaam maakt daarna het virus onschadelijk. Daarna geneest de huid.

Monochloorazijnzuur oplossing 83,8% niet FNA wordt gebruikt bij:

- Wratten, voornamelijk bij dikke wratten op handpalmen en voetzolen.

De oplossing werkt sterk etsend op de huid. Er is dus veel kans op bijwerkingen als u het niet op de juiste manier gebruikt. Daarom zal meestal een arts, doktersassistent of verpleegkundige dit middel aanbrengen.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Niet aanbrengen op ouderdomswratten, genitale wratten, waterwratjes, donker gekleurde, behaarde of vreemd uitzinende wratten en rode, geïrriteerde of geïnfecteerde wratten.
- Niet aanbrengen op wratten die zich helemaal of gedeeltelijk onder de nagel bevinden, vanwege pijn en irritatie omdat de vloeistof onder de nagel trekt.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Monochloorazijnzuur oplossing 83,8% niet FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Over de combinatie met andere medicijnen en andere huidmiddelen zijn geen gegevens bekend. Breng op de wrat alleen andere middelen aan in overleg met uw arts. Soms adviseert de arts om tussen de behandelingen in salicylzuur op de wrat aan te brengen.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Let op! U mag dit medicijn niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet bekend of dit medicijn veilig is voor de baby.

Borstvoeding

Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. Het kan dan schadelijk zijn voor de baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Bij wratten meestal een aantal keer aanbrengen, met een week of anderhalve week ertussen. Soms adviseert de arts om de wrat in de tussenliggende dagen met salicylzuur aan te stippen, om hem verder te verweken. In sommige gevallen is 1 keer aanbrengen genoeg.

Wijze van gebruik

De oplossing werkt sterk etsend op de huid. Er is dus veel kans op bijwerkingen als u het niet op de juiste manier gebruikt. Daarom zal meestal een arts, doktersassistent of verpleegkundige dit middel aanbrengen.

In een enkel geval vraagt de arts u dit medicijn zelf thuis aan te brengen. Zorg dat u hiervoor een uitgebreide uitleg van de arts ontvangt. Meestal is de gebruiksaanwijzing als volgt:

- Om te voorkomen dat u de vloeistof op gezonde huid of in uw ogen krijgt, kunt u wegwerphandschoenen en een veiligheidsbril dragen.
- Zorg dat het flesje stabiel staat, zodat u het niet per ongeluk kunt omstoten.
- Smeer eerst op de gezonde huid rond de wrat een laagje vaseline of zinkzalf of plak er een pleister met een gat, zoals een likdoornpleister. Hiermee beschermt u de gezonde huid. Er kunnen ernstige brandwonden en blaren ontstaan als dit middel op de gezonde huid of op slijmvliezen komt.
- Breng het middel zo nauwkeurig mogelijk op de wrat aan. U kunt dat het best doen met een wattenstaafje, houten stokje of eventueel een penseel, die u in de vloeistof heeft gedompeld.
- Laat de plek aan de lucht drogen.
- Als u wat van dit middel op gezonde huid morst, moet u dit meteen afspoelen met veel water. Houd de huid daarna nog minstens vijf minuten onder een lopende kraan.
- Zorg dat de vloeistof niet op kleding of linnengoed komt.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Heeft u dit medicijn vaker aangebracht dan bedoeld? De huid onder en rond de wrat kan ontsteken. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Als u vergeten bent om de oplossing aan te brengen, dan kunt u de oplossing alsnog zo snel mogelijk aanbrengen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Wanneer u twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Pijn op de plaats waar u het medicijn aanbrengt, prikkelend of stekend gevoel, ontsteking met rode huid, wondjes en korstjes. Dit komt vooral voor bij dunne wratjes. Bij dikke wratten is hier weinig kans op. De klachten gaan vanzelf over. Heeft u er veel last van? Of heeft u na 2 weken nog altijd klachten? Neem dan contact op met uw arts.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Beschadiging van de huid
- Littekens
- Ontkleuring van de huid

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is monochloorazijnzuur, overeenkomend met 838 mg werkzame stof per gram oplossing.

De andere stof (hulpstof) in dit medicijn is gezuiverd water.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is helder en kleurloos. De oplossing is per 10 ml verpakt in een ondoorschijnende glazen fles.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**Fabrikant:**

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.