

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Hydrocortison zetpil 20 mg, 50 mg, 150 mg, 160 mg, 180 mg niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Hydrocortison zetpil 20 mg, 50 mg, 150 mg, 160 mg, 180 mg niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Hydrocortison zetpil 20 mg, 50 mg, 150 mg, 160 mg, 180 mg niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat hydrocortison. Hydrocortison behoort tot een groep medicijnen die bijnierschors hormonen (corticosteroiden) worden genoemd. Dit medicijn remt ontstekingsreacties, vermindert overgevoelighedsreacties en kan een tekort aan lichaamseigen bijnierschors hormonen aanvullen.

Hydrocortison zetpil 20 mg, 50 mg, 150 mg, 160 mg, 180 mg niet FNA wordt gebruikt bij:

- Aambeien (hemoroïden);
- Een tekort aan lichaamseigen hydrocortison als de bijnierschors dit te weinig aanmaakt. Dit is het geval bij de ziekte van Addison en bij aandoeningen waarbij de hypofyse, een klier in de hersenen, niet of niet goed meer werkt.
- Bij patiënten met de ziekte van Addison wanneer zij allergische reacties hebben en reacties waarbij een plotselinge en sterke bloeddrukdaling optreedt als gevolg van een ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U heeft een acute virusinfectie, schimmelinfectie, bacteriële infectie en/of tropische worminfectie heeft.
- U heeft een maagzweer of darmzweer.
- U moet ingeënt worden of bent pas ingeënt met een levend-virus vaccin.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Als u pas geleden een hartinfarct heeft gehad en/of uw hart onvoldoende werkt.
- Als u last heeft van darmafwijkingen of in het verleden maag- of darmzweren heeft gehad.
- Als u psychische stoornissen heeft.
- Als u een verhoogde bloeddruk heeft.
- Als u suikerziekte heeft.
- Als u een verhoogde oogboldruk of staar heeft.
- Als u eerder bijwerkingen van soortgelijke stoffen ondervonden heeft.
- Als u ernstige botontkalking heeft (osteoporose).
- Als u bepaalde vorm van spierzwakte (myasthenia gravis) heeft.
- Als u geopereerd wordt, een ongeval krijgt of een lichamelijk zware periode doormaakt.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij gebruik door jonge kinderen moet er voorzichtig gedoseerd worden, omdat bij hen de groei kan worden geremd.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Hydrocortison zetpil niet FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Hydrocortison heeft invloed op andere medicijnen. Dit noemen we een wisselwerking. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. De belangrijkste wisselwerkingen van dit medicijn zijn met:

- Medicijnen die mogelijk als bijwerking maagzweren kunnen veroorzaken (zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium). Hydrocortison kan de bijwerking van deze medicijnen op de maag versterken.
- Fenytoïne en fenobarbital (medicijnen tegen epilepsie) en rifampicine (medicijn tegen bepaalde infecties). De afbraak van Hydrocortison kan door deze medicijnen versneld worden.

- Antistollingsmiddelen (acenocoumarol en fenprocoumon). Hydrocortison kan de werking van deze medicijnen veranderen.
- Bloedsuikerverlagende medicijnen (zoals tolbutamide, glibenclamide en gliclazide). Hydrocortison kan de werking van deze medicijnen verminderen.
- Plastabletten zoals hydrochloorthiazide, chloortalidon en furosemide. De hoeveelheid kalium in het bloed kan verminderen.
- Bepaalde vaccins, bijvoorbeeld bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR-vaccin), rotavirusvaccin, varicellavaccin (tegen waterpokken) en BCG-vaccin (tegen tuberculose). Hydrocortison vermindert de werkzaamheid van deze vaccins en kan de kans op bijwerkingen ervan verhogen. Als u hydrocortison gebruikt als substitutietherapie is dit geen probleem. Maar als u hydrocortison gebruikt voor andere ziektes kan uw lichaam onvoldoende reageren op deze vaccins. Hierdoor kunt u er ziek van worden. Overleg hierover met uw arts.
- Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

De volgende medicijnen verminderen de werking van hydrocortison. Dit is van belang als u hydrocortison langer dan 2 weken achter elkaar gebruikt. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Ook als u met een van deze medicijnen gaat stoppen.

- De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon.
- De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
- Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.

Borstvoeding

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wijze van gebruik

- Zorg ervoor dat u ontlasting hebt gehad. Ga dus vooraf naar het toilet.
- Was uw handen.
- Haal de zetpil uit de verpakking.
- Ga bij voorkeur op uw zij liggen met uw onderste been gestrekt en uw bovenste been opgetrokken. Kan dat niet, ga dan voorovergebogen staan of gehurkt zitten.
- Breng de zetpil met de punt of stompe kant naar voren langzaam tussen de billen in de anus. Dit gaat makkelijker als u het uiteinde in water of slaolie doopt.
- Blijf zo mogelijk 5 tot 10 minuten liggen om te voorkomen dat de zetpil er weer uitkomt.
- Was uw handen.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Als u vergeten bent om dit medicijn te nemen, dan kunt u de dosis alsnog zo snel mogelijk innemen. Maar als het al bijna tijd is voor de volgende dosis hoeft dit niet. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Wanneer u twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

Als u eerder stopt kunnen de klachten weer terugkomen. Overleg daarom altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Afweersysteem

- Verlaging van de weerstand. Hierdoor is er een grotere kans op het ontstaan of verergeren van infecties. Bepaalde parasitaire infecties uit het verleden kunnen weer opvlammen.
- Overgevoeligheid.

- Benauwdheid.

Bloed en bloedvaten

- Een vermeerdering of een vermindering van het aantal rode en of witte bloedcellen.
- Verhoogde bloeddruk.
- Verhoogd risico op bloedstolsels.

Hormoonhuishouding

- Menstruatiestoornissen.
- Verminderde werking van de bijnier.
- Ontstaan of verergeren van suikerziekte, verhoogde behoefte aan insuline of andere bloedsuikerverlagende medicijnen.
- Ontstaan van het zogenaamde Cushing-syndroom (veranderde vetverdeling, vollemaansgezicht, hormonale afwijkingen).

Zenuwstelsel

- Stemmingsveranderingen (angst, euforie of depressie).
- Ernstige geestesziekte waarbij controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose).
- Verhoging van de druk in de hersenen (verschijnselen die erbij optreden zijn hoofdpijn en minder kunnen zien). Dit treedt vooral op bij kinderen tijdens of vlak na stopzetting van debehandeling.
- Hoofdpijn.
- Slapeloosheid.

Ogen

- Oogafwijkingen zoals verhoogde oogboldruk (glaucoom), staar (cataract) of uitpuilende ogen (exophthalmus).

Hart

- Onvoldoende hartwerking (decompensatio cordis) bij daarvoor gevoelige patiënten.

Maag-en darmstelsel

- Maag-of darmzweren, met verhoogde kans op bloedingen en perforatie.
- Ontsteking van de slokdarm (ulceratieve oesophagitis) of alvleesklier (pancreatitis).
- Opgezette buik of misselijkheid.

Huid

- Dunne huid, met grotere kans op blauwe plekken.
- Roodheid van de huid van het gezicht (erythema).
- (Jeugd)puistjes (acne), huiduitslag en galbulten.
- Overmatige beharing (hirsutisme).
- Tragere genezing van wonden.
- Allergische reacties.
- Onderdrukking van huidreacties bij huidtests.

Spiereen en botten

- Spierzwakte en verschrompeling van spieren (spieratrofie).
- Botontkalking, eventueel botbreuken.

Overig

- Toename van de eetlust en gewichtstoename.
- Vasthouden van vocht en zout.
- Vermindering van de hoeveelheid kalium in het bloed, in ernstige gevallen te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid.

Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen.

- Groeiremming

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de koelkast (2-8°C).

Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is hydrocortison, overeenkomend met 20 mg, 50 mg, 150 mg, 160 mg, of 180 mg zetpil.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn witepsol H15 en colloïdaal silicium anhydraat.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is wit van kleur. De zetpillen zijn per 30 stuks verpakt in een zetpilstrip 2,3 ml FNA (in een omdoos).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in december 2023 door SaVeMaak C.V.