

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Vitamine A-drank 50.000 IE/ml (waterig) FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Vitamine A-drank 50.000 IE/ml (waterig) FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Vitamine A-drank 50.000 IE/ml (waterig) FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat vitamine A. Vitamine A is nodig voor:

- Het functioneren van het netvlies en het hoornvlies van het oog.
- De huid en slijmvliezen.
- De groei en de botontwikkeling bij kinderen.
- Het afweersysteem tegen ziekteverwekkers.
- De voortplanting en de ontwikkeling van een ongeboren baby.

Ons lichaam kan vitamine A niet zelf maken. Daarom moeten we het via ons voedsel binnenkrijgen. Vitamine A komt voor in lever, vis, melkproducten, boter, margarine, eierdooier, donkergroene bladgroenten, koolsoorten en geeloranje gekleurde groenten en fruit. Vitamine A verlaat het lichaam in kleine hoeveelheden. Om gezond te blijven, is daarom telkens nieuw vitamine A via het voedsel nodig.

Vitamine A-drank 50.000 IE/ml (waterig) FNA wordt gebruikt bij:

- Vitaminegebrek;
- Infecties met virussen, zoals mazelen.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Vitamine A-drink 50.000 IE/ml (waterig) FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vitamine A heeft invloed op andere medicijnen. Dit noemen we een wisselwerking. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. De belangrijkste wisselwerkingen van dit medicijn zijn met:

- Colestyramine en paraffine. Deze medicijnen zorgen ervoor dat vitamine A minder goed wordt opgenomen.
- Andere vitaminepreparaten. Deze kunnen ook vitamine A bevatten. Dit kan leiden tot een te hoge inname van vitamine A.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

In de normale dosering tegen een vitamine A tekort kunt u dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Pas op: in grote hoeveelheden kan vitamine A schadelijk zijn voor de ongeboren baby. Gebruik tijdens de zwangerschap daarom per dag niet meer dan 10.000 IE vitamine A. Dit gaat om de totale hoeveelheid vitamine A die u per dag binnenkrijgt, dus via voedsel en via vitaminepreparaten. Als u verschillende vitaminepreparaten tegelijk gebruikt, moet u de hoeveelheden optellen! Ook in lever zit vitamine A. Gebruik tijdens de zwangerschap geen gebakken of gekookte lever, en eet niet vaker dan één keer per dag een leverproduct, zoals paté.

Borstvoeding

U kunt veilig borstvoeding geven als u dit medicijn in de normale dosering gebruikt. Van gebruik van hoge doseringen is de veiligheid niet bekend. Als u verschillende vitaminepreparaten tegelijk gebruikt, moet u de hoeveelheden optellen! Neem bij twijfel contact op met uw apotheker of arts.

Ook in lever zit vitamine A. Gebruik als u borstvoeding geeft geen gebakken of gekookte lever en eet niet vaker dan één keer per dag een leverproduct, zoals paté.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wijze van gebruik

Schud de drank goed om voor gebruik.

Meet de voorgeschreven hoeveelheid af met een maatbeker, maatlepel of doseerspuit.

Neem de drank in.

U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

Een vitaminegebrek is in enkele dagen tot weken opgeheven. Bij mazeleninfectie krijgt u 1 of 2 dagen achter elkaar een grote hoeveelheid vitamine A.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

U moet dit medicijn consequent innemen. Kies daarom vaste tijdstippen om het in te nemen. Af en toe een keer vergeten is echter niet erg. Mocht u een dosis vergeten zijn, neem het medicijn dan alsnog in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Vitamine A zit ook in ons dagelijks voedsel. Bij normaal gebruik zal het daarom geen bijwerkingen geven. De hulpstoffen in deze drank kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Dit kunt u merken aan huiduitslag en jeuk.

Bij langdurig gebruik van een te hoge dosering vitamine A kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

- Misselijkheid
- Zweeten
- Vermoeidheid
- Geïrriteerdheid
- Ziek gevoel
- Vermindering van eetlust
- Pijnlijke onderhuidse zwellingen
- Groeivertraging bij kinderen
- Bot- en gewrichtspijn
- Woekering van bot
- Te veel calcium in het bloed
- Droge en schilferende huid
- Bloedende scheurtjes aan lippen
- Kaalheid
- Oogafwijkingen
- Brosse nagels
- Bloedbeeldafwijkingen
- Vergroting van lever en milt

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de koelkast (2-8°C).
Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is vitamine A, overeenkomend met 50.000 IE vitamine A per ml drank.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn suikerstroop, kaliumsorbaat, citroenzuur-monohydraat, polysorbaat 80, steranijsolie en gezuiverd water.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is helder tot zwak opalescent (bijna doorschijnend, een beetje troebel). De drank is lichtgeel tot geel van kleur. De drank is per 100 ml verpakt in een ondoorschijnende fles met doseergarnituur.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in december 2023 door SaVeMaak C.V.