

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Minoxidil 2% foam (schuim voor cutaan gebruik)

Deze bijsluiter hoort bij een apotheekbereiding van SaVeMaak.

Dit geneesmiddel is speciaal voor u bereid door de apotheek.

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Minoxidil 2% foam en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Minoxidil 2% foam en waarvoor wordt het gebruikt?

Minoxidil 2% foam bevat als werkzame stof **minoxidil**. Minoxidil kan haaruitval verminderen en bij sommige gebruikers de haargroei stimuleren.

Dit middel wordt gebruikt voor de **behandeling van erfelijke haaruitval (androgenetische alopecie)** bij volwassenen. Het effect is vooral zichtbaar op de kruin van de hoofdhuid.

Minoxidil werkt alleen zolang het middel wordt gebruikt. Na het stoppen van de behandeling zal de haargroei meestal weer afnemen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Gebruik dit middel niet:

- Als u allergisch bent voor minoxidil of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel.
- Als uw haaruitval plotseling is ontstaan, onregelmatig is of het gevolg is van ziekte, medicijngebruik of bevalling.
- Als u last heeft van een ontstoken, geïrriteerde, beschadigde of pijnlijke hoofdhuid.
- Bij kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar.

Wees extra voorzichtig met dit middel:

- Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u hart- of vaatziekten heeft of problemen met uw bloeddruk.
- Stop met het gebruik en raadpleeg uw arts als u last krijgt van ernstige roodheid, jeuk, pijn of zwelling van de hoofdhuid.
- Dit middel is uitsluitend bestemd voor gebruik op de hoofdhuid.
- Vermijd contact met ogen, mond en slijmvliezen. Spoel bij contact direct met veel water.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Gebruik Minoxidil 2% foam niet gelijktijdig met andere middelen op de hoofdhuid, tenzij uw arts of apotheker dit heeft geadviseerd.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Minoxidil 2% foam niet tijdens zwangerschap of borstvoeding. Overleg met uw arts of apotheker als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u heeft verteld.

Dosering

- Breng **éénmaal daags** een kleine hoeveelheid schuim aan op de aangedane plekken van de hoofdhuid. Soms wordt een dosering van 2xdaags geadviseerd.

- Gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid.

Wijze van gebruik

- Breng het schuim aan op een **droge en intacte hoofdhuid**.
- Breng het schuim met de vingertoppen aan en masseer dit zachtjes in.
- Was uw handen zorgvuldig na gebruik.
- Laat het schuim volledig drogen voordat u andere haarproducten gebruikt of gaat slapen.

Het kan **2 tot 4 maanden** duren voordat u een effect merkt. Bij uitblijven van resultaat na 4 maanden, raadpleeg uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Sla de vergeten dosis over en ga verder volgens het normale schema. Gebruik geen dubbele hoeveelheid.

Als u stopt met het gebruik

Na stoppen met de behandeling zal het behaalde effect meestal binnen enkele maanden verdwijnen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak voorkomende bijwerkingen:

- Jeuk, roodheid of irritatie van de hoofdhuid
- Droge of schilferende huid

Soms voorkomende bijwerkingen:

- Tijdelijke toename van haaruitval aan het begin van de behandeling
- Veranderingen in haarstructuur

Zelden:

- Duizeligheid
- Snelle hartslag

- Vochtophoping of onverklaarbare gewichtstoename

Stop met het gebruik en neem direct contact op met uw arts bij klachten zoals pijn op de borst, ernstige duizeligheid of plotselinge zwelling van handen of voeten.

5. Hoe bewaart u dit middel?

- Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
 - Bewaren bij kamertemperatuur.
 - De verpakking goed gesloten houden.
 - Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat vermeld.
 - Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
-

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke werkzame stoffen zitten er in dit medicijn?

Minoxidil 2% (20 mg per gram schuim).

De werkzame stof is verwerkt in Espumil® Foam (schuimbasis).

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Het medicijn komt als een schuim (foam) uit de flacon. Elke flacon heeft een inhoud van 100ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in december 2025 door SaVeMaak C.V.