

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Fusidinezuur 2% in HCA 1% crème en zalf niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Fusidinezuur 2% in HCA 1% crème en zalf niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Fusidinezuur 2% in HCA 1% crème en zalf niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat fusidinezuur en hydrocortisonacetaat. Fusidinezuur remt de groei van bepaalde soorten bacteriën. Hydrocortison werkt hetzelfde als een hormoon geproduceerd door de bijnierschors (corticosteroid). Het vermindert verschijnselen van overgevoeligheid, ontstekingen, roodheid, jeuk en schilfering.

Fusidinezuur 2% in HCA 1% crème en zalf niet FNA wordt gebruikt bij:

- Ontstoken en jeukende huidaandoeningen door bacteriën.

Worden uw klachten niet minder na enkele dagen? Neem dan contact op met uw arts.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiters.
- U heeft een huidaandoening die is veroorzaakt door infecties met schimmels of virussen (zoals waterpokken, koortsuitslag en gordelroos). Door dit middel merkt u een verergering van zulke infecties minder snel op.
- U heeft ichtyosis (visschubbenziekte).
- U heeft acne op de plek waar u dit medicijn moet gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- U heeft glaucoom (verhoogde oogboldruk). Als er per ongeluk wat van dit medicijn in uw oog komt, kan hydrocortison uw oogboldruk verhogen. Was daarom na aanbrengen altijd uw handen, zodat het niet per ongeluk van uw vingers in uw oog komt. Gebruik het bij glaucoom niet langer dan 2 weken achter elkaar op de huid van uw gezicht. Raadpleeg direct uw arts als u wazig ziet, een rood of opgezwollen oog krijgt of hevige pijn aan het oog of aan het gezicht krijgt.
- Zorg dat het middel niet in de ogen, de neus, de mond of in een wondje komt, want dat geeft irritatie. Komt het middel hier per ongeluk in terecht, spoel dan direct met veel water.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast fusidinezuur 2% in HCA 1% crème of zalf nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de ingesmeerde plekken. U heeft dan kans dat u dit middel met het volgende weg smeert. Een crème of zalf verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette middel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere middel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Gebruikt u deze crème of zalf gedurende 1 tot 2 weken? Dan kunt u het veilig gebruiken tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen hebben dit middel al jarenlang gebruikt zonder nadelige gevolgen voor het kind. Wanneer u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Borstvoeding

U kunt deze crème of zalf in beperkte mate gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg met uw arts of apotheker. Brengt u dit medicijn op of in de buurt van de tepel aan? Maak de huid dan voor elke borstvoeding schoon met gekookt en daarna afgekoeld water.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen is: 2 keer per dag aanbrengen. Als u de aangedane huid afdekt met een droog verband, is 1 keer per dag meestal voldoende.

Meestal moet u deze crème of zalf niet langer dan 2 weken gebruiken. Gebruik langer dan 2 weken wordt afgeraden omdat de bacterie dan ongevoelig kan worden voor fusidinezuur.

Wijze van gebruik

Uw arts of apotheek zullen aangeven hoeveel u van deze crème of zalf per keer mag smeren. Dat is afhankelijk van hoeveel huid u moet behandelen.

- Maak de geïnfecteerde plekken en een stukje eromheen voorzichtig schoon, volgens de aanwijzingen van de arts of verpleegkundige.
- Korstjes kunt u verwijderen door ze te weken met een beetje baby-olie of met een oplossing van één theelepel keukenzout op één glas water, die u steeds vers maakt.
- Breng de zalf of crème vervolgens aan op de plekken.
- Dek eventueel af met een droog verband.
- Zorg dat de crème of zalf niet in de ogen komt, of in de neus, mond, op slijmvliezen of op open wonden. Het kan daar irritatie geven. Spoel in dat geval met veel water.
- Was de vinger waarmee u het middel heeft aangebracht met zeep.

Probeer te voorkomen dat anderen besmet raken en dat de aandoening zich verder over het lichaam verspreidt door de volgende maatregelen:

- Krab niet aan de plekken;
- Knip de nagels kort en plak de aangedane huid eventueel af. Maak steeds goed schoon onder de nagels;

- Maak gebruik van een eigen handdoek.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Heeft u per ongeluk meer of vaker gebruikt dan de bedoeling was? Voor een keer is dit is niet ernstig. Als u klachten krijgt kunt u contact opnemen met uw arts.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Probeer deze crème of zalf consequent te gebruiken tijdens de kuur. Een infectie kunt u alleen goed bestrijden als u dagelijks smeert. Als u een dosis bent vergeten te gebruiken, dan moet u dit alsnog zo snel mogelijk doen. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

Wanneer de behandeling met fusidinezuur 2% HCA 1% crème of zalf voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren of ontwenningverschijnselen ontstaan

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- Overgevoeligheid van de huid, te merken aan een verergering van de huidaandoening. Neem contact op met uw arts als u dit merkt of als de huidaandoening na een paar dagen nog hetzelfde is of erger is geworden.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

- Prikkeling of brandend gevoel. Dit verdwijnt binnen enkele minuten.
- Huiduitslag, roodheid en jeuk. Vooral in huidplooiën of op andere gevoelige huddelen.
- Zwelling van mond, tong, keel of ogen. Neem dan meteen contact op met een arts.
- Bij gebruik langer dan 2 weken: dunnere huid, waardoor eerder beschadigingen ontstaan, onderhuidse bloedinkjes, blauwe plekken. Streepvormige littekens, ontkleuring of juist donkere verkleuring van de huid, overmatige haargroei.
 - Bij gebruik in het gezicht: huiduitslag rond de mond.
 - Bij gebruik in de buurt van de ogen: verhoging van de oogboldruk.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen (1 maand).

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terecht komen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stoffen in dit medicijn zijn natriumfusidaat (fusidinezuur) en hydrocortisonacetaat, overeenkomend met 20 mg natriumfusidaat (2%) en 10 mg hydrocortisonacetaat (1%) per gram crème of zalf.

De andere stoffen (hulpstoffen) in de zalf zijn wolvet, vloeibare paraffine en witte vaseline.

De andere stoffen (hulpstoffen) in de crème zijn cetomacrogol was, citroenzuur, decyloleaat, kaliumsorbaat, natriumedetaat, sorbitol en gezuiverd water.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is wit van kleur. De crème en zalf zijn per 30 gram verpakt in een tube.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.