Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Beclometason/mesalazine klysma 3 mg/1-4 g/100 g

Lees onderstaande informatie goed door voordat u dit medicijn gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan uw arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook als zij dezelfde klachten hebben.
- Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Beclometason/mesalazine klysma 3 mg/1-4 g/100 g Niet-FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Beclometason/mesalazine klysma 3 mg/1-4 g/100 en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat beclometason en mesalazine. Beclometason is een corticosteroïd (bijnierschorshormoon) en werkt ontstekingsremmend. Mesalazine werkt lokaal ontstekingsremmend in de darm.

Beclometason/mesalazine klysma 3 mg/1-4 g/100 g Niet-FNA wordt gebruikt bij:
- Distale colitis ulcerosa. Dit is een chronische darmontsteking waarbij de linkerzijde en het laatste stuk van de dikke darm zijn aangedaan.

Het kan enkele weken duren voordat u het effect merkt.

Worden uw klachten na 2 tot 3 weken niet minder of worden ze erger? Neem dan contact op met uw arts.

Heeft u een andere aandoening? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn aan u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

U bent allergisch voor beclometason, mesalazine, een ander corticosteroïd, een ander salicylaat of één van de hulpstoffen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- U heeft een verminderde werking van de lever of nieren.
- U heeft een maagzweer of darmzweer.
- U heeft een verhoogde bloedingsneiging.

U gebruikt al andere corticosteroïden, zoals prednisolon.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend. Vertel uw arts of apotheker wel welke medicijnen u gebruikt.

Alcohol heeft geen belangrijke invloed op de werking van dit medicijn.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Overleg dan met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Gebruik tijdens de zwangerschap alleen na overleg met uw arts. Bij langdurig gebruik van corticosteroïden kan de groei van het ongeboren kind worden beïnvloed.

U kunt dit medicijn bij de gebruikelijke dosering doorgaans gebruiken tijdens de borstvoeding. Mesalazine komt in de moedermelk terecht en kan zeer zelden diarree bij de baby veroorzaken. Beclometason komt maar in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Overleg met uw arts als u dit medicijn langdurig gebruikt. Krijgt uw baby diarree? Neem dan contact op met uw arts.

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Dosering

1 klysma per dag inbrengen, voor het slapen gaan.

Wijze van gebruik

- Laat het klysma voor gebruik op lichaamstemperatuur komen, bijvoorbeeld in een lauwwarm waterbadje.
- Zorg ervoor dat uw endeldarm leeg is voordat u het klysma inbrengt. Ga daarom vooraf naar het toilet.
- Ga op uw linkerzij liggen. Houd uw onderste been gestrekt en het bovenste been gebogen.
- Schud het klysma goed. Breng de tuit voorzichtig in de anus.
- Knijp de fles zo veel mogelijk leeg en houd de fles ingedrukt terwijl u deze terugtrekt. Er blijft altijd een beetje vloeistof in de verpakking achter. Dit is normaal.
- Rol op uw buik en blijf ongeveer 5 minuten zo liggen om te voorkomen dat de vloeistof weer naar buiten komt.
- Het medicijn kan bij knoeien of teruglopen bruine, blijvende vlekken in linnengoed veroorzaken. U kunt dit voorkomen door bijvoorbeeld op een absorberend matje te gaan liggen.
- Op BijsluiterPlus.nl is een instructievideo beschikbaar over het toedienen van een klysma.

www.bijsluiterplus.nl

Gebruik het medicijn meestal 2 tot 6 weken achter elkaar, of totdat de ontstekingsverschijnselen zijn verdwenen. Merkt u na 2 tot 3 weken nog geen verbetering of worden de klachten erger? Neem dan contact op met uw arts.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Als u het klysma bent vergeten, is het meestal niet nodig dit alsnog te doen. Gebruik de volgende dosis op het normale tijdstip. Als u de vergeten dosis toch de volgende ochtend gebruikt, moet u daarna een paar uur blijven liggen. Neem geen dubbele dosis.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?
Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Overleg met uw arts als u eerder wilt stoppen dan afgesproken.
Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn
Meestal kunt u na kortdurend gebruik in één keer stoppen. Bij langdurig gebruik kan uw arts adviseren geleidelijk af te bouwen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

- Bij ongeveer 1 op de 10 gebruikers kunnen hoofdpijn, een prikkelend gevoel in de anus, trillen, overgevoeligheid, een gevoel van zwakte of minder gevoel in de handen en voeten optreden.
- Bij ongeveer 1 op de 100 gebruikers kunnen maag-darmklachten, zoals winderigheid, misselijkheid, braken, diarree of zuurbranden, slapeloosheid, onrust of veranderingen in stemming, een grotere kans op darminfecties, tijdelijke onvruchtbaarheid bij mannen, duizeligheid, koorts, vermoeidheid, slaperigheid, haaruitval, acne, nierbeschadiging, ontsteking van de alvleesklier of lever, keelpijn, gewrichtspijn, oorpijn, oorsuizen of overgevoeligheid voor UV-licht optreden.
- Na meerdere weken gebruik kan de werking van de bijnierschors verminderen.

Melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. U kunt bijwerkingen ook melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.www.lareb.nl

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de koelkast (2–8 °C).
Niet in de vriezer bewaren.

De klysma's kunnen verkleuren. Dit heeft geen invloed op de werking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum op het etiket van de apotheek.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?
De werkzame stoffen in dit medicijn zijn beclometasondipropionaat en mesalazine. Het klysma bevat 3 mg beclometasondipropionaat en 1-4 g mesalazine per 100 g.

De andere stoffen (hulpstoffen) zijn gezuiverd water, methylparabeen, propyleenglycol, trometamol, carbomeer 974P, dinatriumedetaat en natriummetabisulfiet.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit medicijn is een klysma en wordt geleverd in een verpakking van 100 g.

Fabrikant

SaVeMaak C.V.
Onderdeel van Apotheek Lemelerveld
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek.

Laatste herziening: september 2026.