Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Magnesiumgluconaatdrank 45 mg/ml FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Magnesiumgluconaatdrank 45 mg/ml FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Magnesiumgluconaatdrank 45 mg/ml FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat magnesiumgluconaat. Magnesiumgluconaat bevat het mineraal magnesium. Mineralen en vitamines zijn nodig voor allerlei lichaamsfuncties. Ons lichaam moet ze met het voedsel binnenkrijgen. Als dit niet voldoende lukt, kan het nodig zijn ze via medicijnen te gebruiken om de tekorten op te heffen.

Magnesiumgluconaatdrank 45 mg/ml FNA wordt gebruikt bij:
- Een tekort aan magnesium in het lichaam.

Na gebruik verdwijnen de verschijnselen van het magnesiumtekort in enkele weken tot maanden.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Bij hartblock, door de cardiale effecten van magnesium.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?
Gebruikt u naast Magnesiumgluconaatdrank 45 mg/ml FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Magnesiumgluconaat heeft invloed op andere medicijnen. Dit noemen we een wisselwerking. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. De belangrijkste wisselwerkingen van dit medicijn zijn met:

- IJzerbevattende medicijnen, zoals ferrofumaraat, ferrogluconaat, ferrosulfaat of multivitamines met ijzer. Gebruikt u ijzerbevattende medicijnen met gereguleerde afgifte (te herkennen aan 'MGA' of 'retard')? U mag dit niet samen met deze maagzuurbinder gebruiken. Overleg met uw arts of een ijzerbevattend medicijn zonder gereguleerde afgifte voor u mogelijk is. Gebruikt u ijzerbevattende medicijnen zonder gereguleerde afgifte? Neem het medicijn met ijzer minimaal 2 uur vóór magnesium of 4 uur na magnesium in.
- De schildklierhormonen levothyroxine en liothyronine. Neem deze medicijnen minimaal 2 uur vóór of 4 uur na het medicijn met magnesium.
- Penicillamine, meestal gebruikt bij reuma en de ziekte van Wilson. Neem dit medicijn minstens 2 uur vóór of 4 uur na het medicijn met magnesium in.
- Triëntine, een medicijn tegen de ziekte van Wilson. Neem dit medicijn minstens 2 uur vóór of 4 uur na het medicijn met magnesium in.
- Antibiotica van het tetracycline-type, zoals doxycycline, minocycline, demeclocycline en tetracycline. Neem de magnesiumgluconaat minstens 4 uur vóór of 2 uur ná deze medicijnen.
- Antibiotica van het chinolon-type: ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine en ofloxacine. Neem deze antibiotica minstens 2 uur vóór of 4 uur na magnesiumgluconaat in.
- Medicijnen tegen osteoporose (broze botten) van het bisfosfonaat-type (zoals alendronaat). Neem de magnesiumgluconaat minstens 2 uur ná het bisfosfonaat.
- Het medicijn bij bloedingsstoornissen eltrombopag. Neem de magnesiumgluconaat minstens 4 uur vóór of 2 uur na eltrombopag.
- Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?
Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wijze van gebruik
Schud de drank goed om voor gebruik.
Meet de voorgeschreven hoeveelheid af met een maatbeker, maatlepel of doseerspuit.
Neem de drank in.
Drink een slok water of spoel uw mond na met wat water. De drank bevat suiker en op deze manier is er minder kans op tandbederf.
Drink daarna nog minstens een half glas water of andere drank.
Neem de drank met wat eten in, tijdens of net na de maaltijd. Dit vermindert de kans op darmklachten.

Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld bij het ontbijt en bij het avondeten.

Om een magnesiumtekort op te heffen, moet u dit medicijn gedurende meerdere maanden gebruiken.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?
Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

- Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 5 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 5 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
- Als u dit medicijn 3 of 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn
Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Diarree of dunne ontlasting en darmkrampen.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Maagklachten, zoals misselijkheid.

Melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen (6 maanden).

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?
De werkzame stof in dit medicijn is magnesiumgluconaat, overeenkomend met 45 mg magnesiumgluconaat per ml drank.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn methylparabeenoplossing (wat bestaat uit methylparahydroxybenzoaat en propyleenglycol), suikerstroop, citroenzuurmonohydraat, bananenessence en gezuiverd water.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit medicijn is helder en kleurloos. De drank is per 500 ml verpakt in een glazen, ondoorschijnende fles met doseergarnituur.

Fabrikant:
SaVeMaak C.V.
Onderdeel van Apotheek Lemelerveld
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met uw apotheek.
Laatste herziening: september 2026.