

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Triamcinolonacetonide 0,1% salicylzuur 2% oplossing FNA**

**Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van de bijsluiter**

1. Wat is Triamcinolonacetonide 0,1% salicylzuur 2% oplossing FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Triamcinolonacetonide 0,1% salicylzuur 2% oplossing FNA en waarvoor wordt het gebruikt?**

Dit medicijn bevat triamcinolonacetonide en salicylzuur. Triamcinolonacetonide behoort tot de bijnierschors hormonen (corticosteroiden). Op de huid toegepast remt triamcinolonacetonide ontstekingen, vermindert het schilfering, werkt het jeukstillend en vermindert het zwelling. De huid kan hierdoor herstellen: de jeuk, droogheid en schilfering nemen af. De huid zal er beter uitzien en is soepeler. Salicylzuur zorgt voor een betere opname van triamcinolonacetonide in de huid, waardoor het beter kan werken.

Triamcinolonacetonide 0,1% salicylzuur 2% oplossing FNA wordt gebruikt bij:

- Eczeem;
- Seborroïsch eczeem;
- Jeuk;
- Psoriasis;
- Lichtovergevoeligheid;
- Andere huidaandoeningen waarbij de huid ontstoken is.

Nadat u het medicijn heeft opgesmeerd, blijft het tussen de twaalf uur tot een dag werken. U heeft binnen een paar uur minder jeuk. Na enkele dagen zijn roodheid en schilfering minder.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

## **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?**

### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U bent allergisch voor andere bijnierschors hormonen of salicylaten.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
- U heeft een huidinfectie.
- Op grote huidoppervlakten.
- Op een beschadigde huid.
- U heeft acne op de plekken waar u deze crème moet gebruiken.
- U heeft een huidaandoening die door het gebruik van bijnierschors hormonen is ontstaan.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

- Bij kinderen, vanwege de kans op het ontstaan van remming van de groei als triamcinolonacetonide langdurig wordt gebruikt. Controle door uw arts is dan noodzakelijk.
- Zorg dat het middel niet in de ogen, de neus, de mond of in een wondje komt, want dat geeft irritatie. Komt het middel hier per ongeluk in terecht, spoel dan direct met veel water.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Triamcinolonacetonide 0,1% salicylzuur 2% oplossing FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de ingesmeerde plekken. U heeft dan kans dat u dit middel met het volgende weg smeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette middel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere middel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.

Gebruik op dezelfde te behandelen plekken alleen andere medicijnen na overleg met uw arts of apotheker. Salicylzuur kan de doorlaatbaarheid van de huid voor andere huidmiddelen versterken.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Waarop moet u letten met alcohol?**

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

#### *Zwangerschap*

In kleine hoeveelheden kunt u dit medicijn veilig gebruiken tijdens de zwangerschap gedurende maximaal 2 weken. Bijvoorbeeld op een of twee plekken ter grootte van een handpalm. Het heeft dan geen nadelige gevolgen voor het kind.

Wilt u dit medicijn langer gaan gebruiken of op meerdere plekken die groter zijn dan een handpalm waarop u het wilt aanbrengen? Overleg dan eerst met uw arts of apotheker.

#### *Borstvoeding*

U kunt veilig borstvoeding geven, als u dit medicijn in kleine hoeveelheid gebruikt. Dus op een onbeschadigde huid of op een klein huidoppervlak. Maar breng dit medicijn niet aan op de borst of rond de tepel.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

## **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Dosering**

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

De standaarddosering is:

- 1 tot 2 keer per dag aanbrengen.

### **Wijze van gebruik**

Let op bij gebruik in de buurt van de ogen of wondjes. Laat het middel niet in het oog of op de oogleden komen. Dit kan beschadigen geven. Komt het per ongeluk toch in het oog of een wondje, spoel dan goed met water om het middel te verwijderen.

- Breng de oplossing dun aan. De oplossing mag er niet afdruppen. Als u het te dik aanbrengt heeft u meer kans op bijwerkingen, terwijl de werking hetzelfde blijft of soms zelfs afneemt.
- Was de vinger waarmee u de oplossing heeft aangebracht daarna met wat zeep. Ook kunt u voor het aanbrengen plastic handschoenen of een 'vingercondoom' gebruiken. Dit is een hoesje dat u over de vinger aanbrengt. Het is te krijgen in uw apotheek.

- Soms adviseert de arts om de ingesmeerde plekken af te dekken met plastic folie of verband. Dit versterkt het effect, maar verhoogt ook de kans op sommige bijwerkingen
- Gebruik niet meer dan ongeveer 5 milliliter (ml) per dag. Als u meer gebruikt heeft u meer kans op sommige bijwerkingen.

#### Wanneer?

- Breng het middel aan op een moment dat u weet dat er het eerstkomende 30 minuten geen water op de huid komt, anders spoelt u het er weer af. Het beste kun u het daarom voor de nacht aanbrengen.
- Smeer de huidaanvoering in wanneer deze verergert of weer opkomt. Vaak begint u met 2 keer per dag. Als de klachten minder worden gaat u over tot 1 keer per dag of om de dag. Het beste is het om dit middel met onderbrekingen te gebruiken. Dus zolang u last heeft van de huidaanvoering 1 of 2 keer per dag smeren tot de huidaanvoering is verdwenen of sterk is verminderd. En dan weer een aantal dagen niet.
- Gebruik verder elke dag de vette crème, die uw arts meestal ook heeft voorgeschreven. Deze gaat irritatie van de huid tegen, waardoor de ontstoken plekken langer wegblijven.
- Psoriasis en andere schilferende huidaanvoeringen: Gebruik het niet vlak voor een UVB-behandeling krijgt.

#### Hoelang?

- Soms geeft de arts aan dit medicijn de eerste keer 2 tot 3 weken achter elkaar te gebruiken en daarna de behandeling telkens na enkele dagen te onderbreken.
- Jeuk: neem contact op met uw arts als de jeuk na 2 weken nog niet is verminderd.
- Zodra de jeuk en de roodheid verminderen, kunt u dit medicijn afbouwen. Smeer het dan nog maximaal 1 keer per dag en sla steeds meer dagen over. Ga hiermee door totdat de klachten zijn verdwenen. Uw huisarts kan u hiervoor een afbouwschema geven. Het is belangrijk dat u het gebruik langzaam afbouwt. Want als u plotseling stopt, kunnen uw huidklachten weer terugkeren.
- Lichtovergevoeligheid: u mag dit middel maximaal 7 dagen gebruiken.

Let op: deze oplossing is licht ontvlambaar door het oplosmiddel (alcohol).

Als dit middel niet werkt of als de aandoening zich uitbreidt, moet u weer contact opnemen met de arts.

#### **Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

Laat u bij het gebruik van dit medicijn leiden door de ernst van uw aandoening. Gebruik het daarom als de aandoening verergert en verminder het gebruik als de klachten afnemen. Vaker dan eens in de 12 uur insmeren heeft geen zin, maar vergroot wel de kans op bijwerkingen. Mocht u het medicijn er vlak na het aanbrengen per ongeluk afwassen, dan kunt u het wel opnieuw aanbrengen.

### **Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn**

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt niet zomaar stoppen met dit medicijn. Uw huidklachten kunnen dan terugkeren. Overleg hierover met uw arts. Uw huisarts kan u een afbouwschema geven. Blijf tijdens het afbouwen met dit medicijn uw huid goed verzorgen met een vette zalf of crème. Ga hier ook mee door als u helemaal met dit medicijn bent gestopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

#### **Vaak** (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Jeuk, prikkeling of branderigheid enkele minuten na aanbrengen. Vooral als u het medicijn aanbrengt op het gezicht, in huidplooiën of op een beschadigde en ontstoken huid. Dit verdwijnt meestal binnen enkele uren. Neem contact op met uw arts als dit aanhoudt of als u hier teveel last van heeft.

#### **Soms** (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Huidinfecties. Dit medicijn kan de verschijnselen van een huidinfectie maskeren. U merkt dus minder snel op dat de huid met een bacterie, schimmel of virus is geïnfecteerd. De verschijnselen van een infectie, zoals jeuk, zwelling en roodheid treden immers minder op. De infecties kunnen zich daardoor ongemerkt uitbreiden. Gebruik dit medicijn daarom niet op een plek van de huid waarvan u weet of vermoedt dat deze is geïnfecteerd met een schimmel, bacterie of virus. Dus bijvoorbeeld niet op of in de buurt van voetschimmel, zweren, gordelroos en een koortslip. Als u ook een medicijn tegen deze infectie gebruikt, kunt u het wel toepassen.
- Overgevoeligheid voor triamcinolonacetonide, salicylzuur of één van de bestanddelen van dit huidmiddel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten, jeuk, een verergering van de huidaandoening of doordat de huidaandoening niet overgaat.
- Bij aanbrengen op acne-plekken: een verergering van acne. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
- Bij gebruik op grote huidoppervlakken: opname van te veel salicylzuur door de huid heen in het bloed. Dit kan bijwerkingen geven, zoals hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid, misselijkheid, oorsuizen, doofheid, zweten of een snellere ademhaling. De kans op deze bijwerking is heel klein, maar neemt toe bij hogere sterktes en als u de huid na het aanbrengen van het medicijn, afdekt met plastic folie. Vooral kleine

kinderen zijn gevoelig voor de effecten van salicylzuur in het bloed. Gebruik dit medicijn daarom alleen in overleg met uw arts bij kinderen onder de 4 jaar.

Na gebruik gedurende meer dan 3 weken:

**Vaak** (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Dunnere huid, waardoor u sneller wondjes of blauwe plekken krijgt. Stop met het gebruik als u merkt dat u hier last van heeft. De huid kan zich dan weer herstellen. Smeer dit medicijn vanwege deze bijwerking liever niet op dunne huid, zoals van het gezicht en de geslachtsdelen. Oude mensen hebben een erg dunne huid. Daarom moeten zij dit medicijn extra spaarzaam gebruiken.

**Soms** (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Bij gebruik in het gezicht: rode, jeukende uitslag rond de mond, neus of ogen. Soms pijnlijk of met schilfering. Neem dan contact op met uw arts. Meestal verdwijnen deze klachten vanzelf als u stopt met dit medicijn.
- Meer haargroei op de plek waar u het medicijn heeft aangebracht.
- Cataract (grauwe staar), als dit medicijn per ongeluk steeds weer in het oog komt. Wees dus voorzichtig met smeren in het gezicht en smeer het alleen op advies van uw arts rond of in de buurt van het oog.
- Als u plotseling stopt met dit medicijn, kunnen de klachten weer terugkomen. U merkt dit aan een intens rode huid, een brandend gevoel en tintelingen. Ook op plaatsen op de huid waar u eerder geen klachten had. Bouw het gebruik daarom langzaam af.

Bij langdurig gebruik, van meerdere weken tot maanden, kunnen nog andere bijwerkingen optreden. De kans hierop is groter als u grote hoeveelheden van dit medicijn gebruikt. Bijvoorbeeld als een volwassene gedurende meerdere maanden meer dan 50 ml oplossing per week gebruikt.

**Soms** (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Littekenachtige strepen (striae), rode plekken, verbleking of juist een donkere verkleuring van de huid op de plek waar u dit medicijn aanbrengt. Deze huidafwijkingen zijn meestal blijvend. Neem contact op met uw arts bij deze verschijnselen.
- Bij mensen met glaucoom (verhoogde oogboldruk) kan dit medicijn de oogboldruk verder verhogen. U kunt dit merken aan wazig zien, minder zien, een rood of opgezwollen oog, hevige pijn aan het oog of aan het gezicht, misselijkheid en braken. Neem bij deze klachten direct contact op met uw arts. De kans dat u hier last van krijgt is groter als er per ongeluk wat van dit medicijn direct in uw ogen komt. Smeer het daarom alleen op advies van uw arts rond of in de buurt van het oog. Deze bijwerking kan ook ontstaan als veel medicijn via de huid in het bloed is gekomen en zo het oog heeft kunnen bereiken. Meestal zal uw arts adviseren om dit medicijn niet langer dan 4 weken in het gezicht te gebruiken.
- Bij kinderen een vertraging van de lengtegroei, doordat de hoeveelheid groeihormoon vermindert. De groeivertraging is meestal zeer gering. Sommige artsen

controleren kinderen die dit medicijn langer dan 3 maanden gebruiken voor de zekerheid op lengte.

### **Melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.  
Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen (6 maanden).

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

De werkzame stoffen in dit medicijn zijn triamcinolonacetonide en salicylzuur, overeenkomend met 1 mg triamcinolonacetonide (0,1%) en 20 mg salicylzuur (2%) per ml oplossing.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn alcohol en benzalkoniumchloride.

### **Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Dit medicijn is helder en kleurloos. De oplossing is per 100 ml verpakt in een fles.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### **Fabrikant:**

Savemaak C.V.  
Vilstersestraat 33  
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op [www.BijsluiterPlus.nl](http://www.BijsluiterPlus.nl).

**Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in december 2023 door SaVeMaak C.V.**