

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Miconazolnitraat 2% en ureum 40% in watervrije zalf niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Miconazolnitraat 2% en ureum 40% in watervrije zalf niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Miconazolnitraat 2% en ureum 40% in watervrije zalf niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat miconazolnitraat en ureum. Miconazol doodt schimmels, gisten en bepaalde bacteriën. Ureum zorgt ervoor dat nagels dunner worden. Een antischimmelmiddel zoals miconazol kan dan beter doordringen in een schimmelnagel.

Miconazolnitraat 2% en ureum 40% in watervrije zalf niet FNA wordt gebruikt bij:

- Schimmelinfecties van de nagels. Dit worden ook wel kalknagels genoemd.

Het kan 8 maanden duren voor de hele nagel weer beter is.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Niet aanbrengen op de ontstoken of beschadigde huid.
- Bij pasgeborenen en zuigelingen tot 1 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Laat de zalf niet in het oog of op de oogleden komen. Dit kan schadelijk zijn voor het oog.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Miconazolnitraat 2% en ureum 40% in watervrije zalf niet FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Miconazolnitraat 2% en ureum 40% in watervrije zalf niet FNA heeft invloed op andere medicijnen. Dit noemen we een wisselwerking. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. De belangrijkste wisselwerkingen van dit medicijn zijn met:

- De bloedverduuners fenprocoumon en acenocoumarol. Miconazol versterkt het effect van deze medicijnen. Neem contact op met uw arts.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de ingesmeerde plekken. U heeft dan kans dat u dit middel met het volgende wegsmeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette middel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere middel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.

Gebruik op de behandelde plekken alleen andere huidmiddelen na overleg met uw arts of apotheker.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.

Borstvoeding

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Heeft u dit medicijn op of rond de tepel aangebracht? Maak voor de borstvoeding de tepel dan schoon met (afgekoeld gekookt) water.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

1 maal per dag aanbrengen en dagelijks delen van de nagel verwijderen. Ga hiermee door tot u in de nagel geen aantasting van de schimmel meer ziet. Dit duurt meestal 1 tot 2 weken.

Wijze van gebruik

Het beste kunt u de zalf voor u gaat slapen op de nagel aanbrengen.

- Dek de omliggende huid eventueel af met een beetje vaseline of zinkzalf om de gezonde huid tegen irritatie te beschermen.
- Breng dan de zalf op de nagel aan. Was uw handen.
- Dek de nagel af met een pleister.
- Verwijder na 24 uur de zalfresten door met warm water de nagel te wassen.
- Schaaf of vijl de verweekte nageldeeltjes eraf.

Gebruik dit medicijn tot u geen aangetaste nagel meer ziet. Dit duurt 1 tot 2 weken. De schimmelinfectie zelf is niet weg en zal opnieuw in de nagel groeien. Schimmelnagels zijn zeer hardnekkig en kunnen alleen verdwijnen als u de behandeling combineert met medicijnen om in te nemen. Ook dan duurt het nog meerdere maanden voor de nagel weer gaaf is.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Een keer vergeten is niet zo erg. Gebruik het dan alsnog, zodra u eraan denkt. Als het al bijna tijd is voor de volgende toepassing, sla het dan over. Probeer zo veel mogelijk uw normale schema te volgen, dan heeft u sneller resultaat.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

Als u stopt voordat de schimmel volledig is verdwenen, kan de infectie makkelijk terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Rood of droog worden van de huid, branderig of warm gevoel en jeuk.
- Overgevoeligheid voor dit medicijn.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stoffen in dit medicijn zijn miconazolnitraat en ureum, overeenkomend met 20 mg miconazolnitraat (2%) en 400 mg ureum (40%) per gram zalf.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn wolvet en witte vaseline.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is wit-gelig van kleur. De zalf is per 30 gram verpakt in een pot met spatel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**Fabrikant:**

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.