Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Triamcinolonacetonide ovule 4 mg

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. **Wat is Triamcinolonacetonide ovule 4 mg niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?**
2. **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?**
3. **Hoe gebruikt u dit medicijn?**
4. **Mogelijke bijwerkingen**
5. **Hoe bewaart u dit medicijn?**
6. **Inhoud van de verpakking en overige informatie**

1. Wat is Triamcinolonacetonide ovule 4 mg niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat triamcinolonacetonide. Triamcinolonacetonide behoort tot een groep medicijnen die corticosteroïden worden genoemd. Dit zijn bijnierschorshormonen. Triamcinolonacetonide remt ontstekingen en zorgt voor minder schilfers, jeuk en zwelling.

Triamcinolonacetonide ovule 4 mg niet FNA wordt gebruikt bij:
- Lichen planus van de vagina;
- Lichen sclerosus.

U heeft binnen een paar uur minder jeuk.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- U bent allergisch voor een ander bijnierschorshormoon dan triamcinolonacetonide.
- U heeft in of rond de vagina een infectie met een virus, bacterie, gist of schimmel. Bijvoorbeeld candida of herpes. Door dit medicijn merkt u het minder snel als die besmetting erger wordt.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?
Gebruikt u naast Triamcinolonacetonide ovule 4 mg niet FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik in en rond de vagina alleen andere medicijnen en zalven als u dat met uw arts heeft overlegd.

Gebruik wel iedere dag een neutrale zalf om uw huid in te vetten. Vraag uw arts welke zalf daarvoor het beste is.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?
Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent voor een korte tijd.
Gebruikt u de ovules meerdere weken? Dan is het verstandig dat de arts of verloskundige de groei van de baby goed controleert. Heeft u hier vragen over? Stel ze aan uw arts of apotheker.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

De standaarddosering is:

- Lichen planus van de vagina en lichen sclerosus:
  Meestal 3 keer per week. Bijvoorbeeld op zondag, woensdag en vrijdag. Het kan ook zijn dat de arts adviseert om de ovules elke week 3 dagen achter elkaar te gebruiken en daarna steeds een paar dagen niet.

Gebruik wel iedere dag een neutrale zalf om uw huid in te vetten.

Wijze van gebruik

- Haal de ovule uit de strip.
- Ga op uw rug liggen.
- Trek uw benen iets op en houd ze een beetje uit elkaar.
- Duw de ovule zo diep mogelijk in uw vagina.
- Als de ovule moeilijk glijdt, kunt u hem eerst nat maken met wat water.

Het beste kunt u de ovule indoen voor u gaat slapen. U ligt dan namelijk een paar uur plat. Hierdoor kan de gesmolten ovule langer in de vagina blijven. Bovendien heeft u minder last dat het vet uit de vagina gaat lekken.

Overleg met uw arts hoelang u de ovules kunt gebruiken. Dat hangt af van de ernst van uw aandoening.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Heeft u per ongeluk vaker een ovule gebruikt dan de bedoeling was? Voor een keer is dit is niet erg. Als u vaak te veel gebruikt kunt u vervelende bijwerkingen krijgen.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Bent u een keer vergeten de ovule in te brengen? Dat is niet erg, doe het dan de volgende avond. En gebruik de avond erna geen ovule. U verschuift uw schema dus 1 of 2 dagen. Gebruik niet 2 ovules op één dag.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Allergische reactie. Dit merkt u aan roodheid, bulten of jeuk. Of u merkt dat de ontsteking en jeuk niet over gaan. Overleg met een arts als dat bij u het geval is.
- Bij gebruik gedurende meerdere weken: dunnere huid in en rond de vagina. Hierdoor heeft u meer kans dat uw huid beschadigd raakt. Wondjes daar genezen langzamer.

Het gesmolten vet van de ovule kan uit de vagina lekken. U kunt ’s nachts een inlegkruisje of maandverband dragen om uw ondergoed te beschermen. Maar voor lichen sclerosus en lichen planus is het beter als u ’s nachts geen ondergoed aan heeft.

Het vet in de vagina kan een condoom of pessarium (vrouwenring) zwakker maken. Hierdoor kan dat scheuren. Een pessarium is niet meer betrouwbaar als u deze ovules heeft gebruikt.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de koelkast (2-8°C).

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is triamcinolonacetonide, 4 mg triamcinolonacetonide per ovule.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn lactosum monohydricum, siliciumdioxide colloïdaal watervrij (Witepsol H15 (vet).

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit medicijn is wit van kleur. De ovules zijn per 30 stuks verpakt in zetpilstrips FNA 2,3 ml in een doosje.

Fabrikant:
SaVeMaak C.V.
Onderdeel van Apotheek Lemelerveld
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in september 2026 door SaVeMaak C.V.